

BIOLOGIA CENTRALI-AMERICANA.

ZOOLOGIA.

Class INSECTA.

Order HYMENOPTERA.

ACULEATA (continued).

Section HETEROGYNA.

Fam. FORMICIDÆ*.

Les descriptions des fourmis de l'Amérique centrale se trouvent dispersées dans une foule de monographies égrenées des divers auteurs. Dans mes "Études myrmécologiques," en 1884 (Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. xx. p. 91), j'ai décrit les espèces récoltées par le Dr. O. Stoll en Guatémala. Dans le 'Bullettino della Società Entomologica Italiana,' 1890, p. 38, et 1896 (1 trim.), M. le Prof. Emery a décrit, sous le titre de "Fauna Neotropica," de nombreuses espèces récoltées à Costa Rica par M. Alfaro. Diverses espèces du Mexique ont été décrites par M. Pergande dans les 'Proceedings of the California Academy of Sciences,' vols. iv. et v. 1894 et 1895. Dans la 'Revue d'Entomologie,' 1893, p. 148, et dans le 'Bulletin de la Société Entomologique de France,' 1898, p. 244, M. André a décrit quatre espèces nouvelles du Mexique. Mais une grande quantité d'espèces de l'Amérique centrale sont les mêmes que celles de l'Amérique du sud et sont décrites dans les ouvrages qui traitent de cette dernière faune.

Je tiens à remercier les personnes qui m'ont encouragé et aidé dans ce travail, avant tout M. Godman, le regretté M. Salvin, et M. Champion, à l'inépuisable obligeance desquels je suis redevable d'autant d'aide que de matériel, et surtout de la patience avec laquelle ils ont supporté les retards dont le surmenage auquel j'ai été soumis d'autre part a été la cause.

Je suis très particulièrement redevable à M. H. Pittier de Fáhéga et à M. Ad. Tonduz, mes compatriotes, vivant à Costa Rica, de l'obligeance qu'ils ont mise à me procurer le produit de leurs chasses, ainsi qu'à M. Henri de Saussure, qui m'avait déjà autrefois

* Par A. FOREL.