

COMPARATIVE TABLE OF THE SPECIES OF *CYCLOTUS* AND *CYCLOPHORUS*.

	Operculum.	Sculptura.	Color.	Figura.	Peristoma.	Diam. maj.	Alt.	Apert.	Patria.
<i>irregularis, Pfr.</i>	calcareum.	verticaliter confertim striata.	fulvus, opacus.	conoideo-depressa, umbilico lato.	simplex, basi sepius emarginatum.	mm. 37 42	mm. 19 26	mm. 18½ 19	Costa Rica.
<i>bisinuatus, v. Mart.</i>	"	verticaliter undulato-plicatula.	fulvus, nitidulus.	conoideo-subglobosa, umbilico medioeri.	simplex, supra et infra emarginatum.	38½	31	20	Guatemala, Costa Rica.
<i>dysoni, Pfr.</i>	"	verticaliter undulato-rugulosa.	fulvus-olivaceus, sericeus.	conoideo-globosa, umbilico medioeri.	simplex, margine supra declivi.	16 30	22	14	S.W. Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica.
—, var. <i>ambiguus, n.</i>	"	verticaliter costulato-rugosa.	"	subdepressa.	"	23	16	11	E. Mexico.
—, var. <i>affinis, n.</i>	"	verticaliter undulato-rugosa.	castaneus.	"	simplex vel subduplex.	20	15	10	S. Panama.
(— var. ?) <i>berendti, Pfr.</i>	?	verticaliter confertim subundulato-rugosa.	fulvus-lutescens, sericeus.	conoides, subdepressa, umbilico medioeri.	duplex, solutum.	22½	16	10	Yucatan.
<i>boucardi, Ang.</i>	calcareum.	rugis antorsum ascendentibus.	albus, fasciis 2 fuscis.	conoideo-depressa, umbilico lato.	simplex, intus emarginatum.	33	26	15½	E. Costa Rica.
<i>giganteus, Sow.</i>	"	verticaliter rugoso-striata.	corneo-fulvus, fasciis unica infera.	depressa, umbilico lato.	simplex.	50 61	22 35	25 28	Panama (?)
<i>ponderosus, Pfr.</i>	corneum.	rugis antorsum ascendentibus.	cinereo-fuscus, opacus.	conoideo-depressa, umbilico lato.	simplex.	40	24	18	Guatemala.
<i>maleri, Cr. & Fisch.</i>	"	subtiliter malleato-rugulosa.	pallide olivaceo-fuscus.	"	"	26	15	13	S.W. Mexico, Tabasco.
<i>texturatus, Sow.</i>	"	verticaliter undulato-rugosa.	olivaceo-fulvus, opacus.	depressa, umbilico lato.	simplex, margine supero subhorizontali.	35 45	20 20½	15 19	S.W. Mexico, Guatemala.
<i>boucardi, Pfr.</i>	"	malleato-tuberculato-rugosa.	fulvo-fasciatus.	conoideo-depressa, umbilico lato.	simplex.	34	23½	17	E. Mexico.
<i>lutescens, Pfr.</i>	"	verticaliter filoso-striata.	fulvus-lutescens, sericeus.	conoideo-globosa, umbilico medioeri.	"	18 20	12 15	9 10	Mexico, Costa Rica (var.).
<i>cooperi, Tryon.</i>	?	confertim inciso-striata.	corneus.	conoideo-trochiformis, umbilico lato.	"	16	12	7	N.W. Mexico.
<i>mexicanus, Menke</i>	corneum.	verticaliter confertim striata.	pallide carneus.	depressa, umbilico lato.	incrassatum, intus emargin., lobo infero libero.	20 25	12 17	8 12	E. Mexico.
<i>salleanus, v. Mart.</i>	"	"	pallide fulvus.	conoideo-depressa, umbilico lato.	expansum, intus emargin., lobo inf. adnato.	25 28	15 16	12	E. Mexico, S.W. Mexico.
<i>purus, Forb.</i>	?	spiratum lirata.	albus.	depressa, umbilico latissimo.	simplex.	51	20		?