

COMPARATIVE TABLE OF THE SPECIES OF *HELICINA* (continued).

	Figura.	Color.	Sculptura.	Basis columellæ.	Peristoma.	Diam.	Alt.	Apert.	Patria.
<i>durangoana</i> , <i>Mouss.</i> .....	depressa conoidea, angulata.	albidus, opacus.	subtiliter spiratim striata.	subperpendicularis, tuberculo obtuso.	breviter expansum.	mm. 8½ 10	mm. 6½ 8½	mm. 4½ 5	N. Mexico.
<i>borealis</i> , <i>v. Mart.</i> .....	depressa, apice prominulo, rotundata.	obsolete maculosus.	striatula.	brevissima rectangularis, callo crasso circumscripto.	incrassatum, vix expansum.	11½	7½	5	N. Mexico.
<i>oweniana</i> , <i>Pfr.</i> .....	conico-globosa.	albidus vel stramineus, nitidus, sutura alba.	subtilissime oblique et spiratim striatula.	brevis arcuata, angulo obsolete.	vix expansum, subangustum, aurantiacum.	8 9	7 8½	4 4½	Chiapas, Guat. mala.
—, var. <i>anozona</i> , <i>v. Mart.</i>	globosa.	carneo-flavescens, zona suturali alba vel pallide flava.	"	"	incrassatum, luteum.	8 7½	7 6½	5 vix 4	Guatemala.
—, var. <i>coccinostoma</i> , <i>Morel.</i>	conico-globosa.	albus, citrinus, vel fulvus.	?	angularis.	sub-bilabiatum, coccineum, reflexum.	9			Guatemala.
<i>sanguinea</i> , <i>Pfr.</i> .....	conoideo-depressa, orbiculata, subangulata.	sanguineus.	punctato-striatula.	antrorsum dentata.	rectum, sublabiatum.	10½	6½	5½	Honduras.
<i>delicatula</i> , <i>Shuttl.</i> } ( <i>heloisea</i> , <i>Sallé</i> ) }	conoideo-globosa.	luteus, plerumque fusco unifasciatus, sutura pallida.	subtilissime spiratim et oblique lineolata, nitida.	brevis, arcuata, infermis.	expansum, tenuiusculum.	8 11	6½ 9	5½ 5½	E. Mexico.
<i>arenicola</i> , <i>Morel</i> .....	depressa conoidea.	albido-flavescens, maculis corneo-pallucidis obsolutis.	spiratim striata.	tuberculata, callo crasso circumscripto.	incrassatum, breviter reflexum.	7			Yucatan.
<i>antoni</i> , <i>Pfr.</i> (an juv.?) ...	globoso-conica, obsolete angulata.	lutescenti-carneus, variegatus.	leviter rugulosa.	breviter recedens, angulo subrecto.	tenuis, expansiusculum.	3	2	1½	Honduras.
<i>punctisulcata</i> , <i>v. Mart.</i> ...	conoidea, subangulata.	rufescens, spiratim: saepius fasciatus: callo flavo.	sulcis distantibus punctiferis.	subangulata.	leviter expansum.	9	7½	4½	W. Mexico.
( <i>flavida</i> , <i>Menke</i> .....	rotundato-conica, basi subplanulata.	pallide luteus vel albidus vel rufescens, saepius apice rubro, interdum fasciatus.	spiratim striatula, nitida.	arcuata, infermis.	breviter expansum, albidum.	5½ 6	5½ 6	3	E. Mexico, Tabasco, Guatemala.