

COMPARATIVE TABLE OF THE SPECIES OF *GLANDINA*.

Nomen.	Figura.	Sculptura.	Coloratio.	Sutura.	Spira versus apicem.	Columella.	Long.	Diam.	Apert.	Patria.
<i>indusiata</i> , Pfr.	ventricosio-ovata.	laviuscula, nitida, obsolete plexo-granulata.	pallide flavida, peristoma fusco deciduo.	denticulata.	obesa.	arcuata.	mm. 50 43	mm. 26 22	mm. 32 26	Central & S.W. Mexico.
<i>vanuxemi</i> , Lea (<i>coronata</i> , Pfr.)	succato-oblonga.	plexo-granulata, nitidula.	pallide flava, maculis albis et lineolis fuscis spiralibus.	valde et inaequaliter denticulata.	"	"	97 70 53	35 31 24	51 45 34	Central & S.W. Mexico.
—, var.	"	"	"	"	attenuata.	"	100	42	58	S.W. Mexico.
—, var. <i>guttata</i> , Fisch. & Crosse.	succato-cylindrica.	"	griseo-flavescens, maculis albis et varic. fuscis.	inaequaliter denticulata.	obesa.	valde arcuata.	68 64	28 28	40 37	Central Mexico.
<i>sowerbyana</i> , Pfr.	ovato-oblonga, subsaccata.	plexo-granulata, nitidula, sericea.	pallide fulva (detritu rufo-grisea), varicib. fuscis.	denticulata, obsolete marginata.	attenuata.	arcuata.	109 103 90	46 42 40	55 52 54	E. Mexico, S.W. Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama.
—, var. <i>estefanie</i> , Streb.	fusiformis.	"	"	"	"	"	59	24½	31	E. Mexico.
<i>coulteri</i> , Gray	subconoideo-oblonga.	leviter plexo-granulata.	pallide fulva, varicibus fusco-albis.	levissime denticulata.	sat obesa.	"	90 76 67	30 27 26	57 41 37	E. and Central Mexico.
<i>cuneus</i> , v. Mart.	succato-lanceolata.	subtiliter plexo-granulata, tenuis.	fulvo-fusca, nitidula.	leviter crenulata.	"	"	49 51	19 19	29 27	S.W. Mexico.
<i>aurata</i> , Morel.	fusiformi-oblonga.	dense granulata.	obscura fulva, strigis fuscis, varicib. aureis.	obtusae inaequaliter denticulata.	"	rectiuscula.	87 84 (94) 78	36 34½ (36) 34	42 (49) 43	Guatemala, Costa Rica.
<i>fusiformis</i> , Pfr.	ovato-fusiformis.	conferim costulata, levissime decussata.	aurantia, strigis fuscis.	marginata, leviter crenulata.	attenuata.	subrecta.	87 99	38 40	49 55	Guatemala.
—, var. <i>multiochila</i> , v. Mart.	"	"	pallide flava, peristomate rubro.	"	"	"	107	42	58	Guatemala.
<i>ghiesbreghtii</i> , Pfr.	angulose fusiformis.	plicato-costulata, levissime decussata.	pallide fulva.	marginata, leviter crenulata.	"	arcuata, supra intumescens.	55	20½	19½	Chiapas.
<i>decussata</i> , Desh.	attenuato-fusiformis.	leviter costulata, levissime decussata.	rubescens - fulva, nitidula.	leviter marginata, albida, crenulata.	"	"	49 50	19 18½	25 26	N. Guatemala.
<i>tenella</i> , Streb.	fusiformis.	leviter costulata.	pallide flava.	marginata, crenulata.	modice attenuata.	subrecta.	32	15	19	E. Mexico.
<i>cumingi</i> , Beck. (a) <i>fulvo-rosea</i> . (b) <i>flavida</i> . (c) <i>rubromarginata</i> .	ovato-oblonga.	leviter costulata, obsolete decussata.	(a) <i>rufescens</i> vel <i>rosea</i> , (b) <i>flavida</i> , (c) <i>flavida</i> , sutura rubra.	eximie marginata, crenulata.	obesa.	"	46 50 45 44	19 22 20 21	26 30 25 25	S.E. Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama.