

<i>carmenensis</i> , <i>Morel</i>	fusiformi-oblonga.	costulata, obsolete decussata.	rufescens (flavida).	marginata, crenulata.	subattenuata.	rectiuscula.	49	20	28	Yucatan, Guatemala, Honduras.
<i>liebmanni</i> , <i>Pfr</i>	elongata, subcylindrica.	plicato-costulata.	cinereo-albida, opaca.	inæqualiter denticulata.	modice obesa.	recta, brevis.	70 64	25 24	31 35	Central and S.W. Mexico.
—, var. <i>insignis</i> , <i>Pfr</i> ..	subovato-oblonga.	"	carnea, plicis albidis.	"	"	"	48	19½	25	N.W. Mexico.
<i>audebardi</i> , <i>Desh</i>	attenuato-elongata.	complanato-pliculosa.	pallide flava vel albida, nitidula.	denticulata.	sat obesa.	subrecta, brevius.	62 58 53	22 21 20	27 27 27	E., Central, and S.W. Mexico.
—, var. <i>amæna</i> , <i>v. Mart</i> .	subovato-oblonga.	confertim striata, anfr. ult. leviores.	albida, nitidula.	leviter denticulata.	"	"	45 43	18 18	22 21	E. Mexico.
—, var. <i>miradorensis</i> , <i>Streb</i> .	"	"	cornea, diaphana.	"	"	"	43	19	23	E. Mexico.
—, var. <i>minor</i>	"	"	isabellina.	denticulata.	"	"	31	13½	16	S.W. Mexico.
<i>isabellina</i> , <i>Pfr</i>	fusiformi-oblonga.	spiratim striatula.	isabellina, diaphana.	marginata.	obtusa.	strictiuscula.	26	10	13	Mexico.
<i>longula</i> , <i>Fisch</i> & <i>Crosse</i> .	fusiformi-turrita.	leviter decussata.	flava.	denticulata.	modice obesa.	subrecta.	45	16	22	N.E. Mexico.
—, var. <i>jalapana</i> , <i>v. Mart</i> .	"	"	fulvo-fusca.	"	"	modice arcuata.	55	19	26	E. Mexico.
<i>pinicola</i> , <i>Fisch</i> & <i>Crosse</i> .	subcylindrico-oblonga.	obsolete rugato-plicata, decussata.	fulvido-fusca.	irregulariter denticulato-crenulata.	obtusa.	arcuata.	50½	21	27	Central Guatemala.
<i>turris</i> , <i>Pfr</i>	conico-oblonga.	subinæqualiter striatula.	corneo-flavescens.	levissime crenulata.	sat obesa.	subrecta.	43 38	15 15	19 17½	N.W. Mexico.
<i>mazatlanica</i> , <i>v. Mart</i>	subcylindrica.	costulato-striata.	fulva.	subangulata, non denticulata.	"	"	32	12 13	16	N.W. Mexico.
<i>pseudoturris</i> , <i>Streb</i>	turrita.	leviter costulato-striata.	obscura fulva.	marginata.	"	"	26	10½	13	S.W. & S. Mexico
<i>anomala</i> , <i>Ang</i>	"	complanato-striata.	fusca.	valide granulata.	obesa, obtusa.	recta.	46	14	15	S.E. Costa Rica.
<i>simplex</i> , <i>Streb</i>	"	leviter striatula, spiratim striata.	flava, nitida.	indistincte marginata.	obesa.	modice arcuata.	31	11	14	S. Mexico.
<i>conularis</i> , <i>Pfr</i>	"	sublevis.	fusculo-carnea.	filo albido marginata.	obtusa.	levissime arcuata.	23	9	11	Mexico.
<i>excavata</i> , <i>v. Mart</i>	subcylindrica.	confertim striatula.	flava, nitidula.	indistincte marginata.	valde obesa.	profunde arcuata, sulcata.	31	11½	16	N.W. Mexico?
<i>largillierii</i> , <i>Pfr</i>	anguste ovato-oblonga.	leviter striatula, spiratim distincte striata.	pallide carneo-flavida.	denticulata, marginata.	obesa, distinctius costulata.	subrecta.	30 27 23	11 11 9½	13 13 11	Yucatan, N. Guatemala, S.E. Costa Rica.
<i>multispira</i> , <i>Pfr</i>	oblongo-ovata, basi saccata.	leviter striatula.	corneo-fusca.	crenulato-marginata.	sat obesa.	"	26	11	12	S. Mexico.