

lamelliformes, mais fortement proéminentes en arrière en triangle allongé. Elles sont nettement séparées l'une de l'autre et non pas soudées comme chez l'*E. rogeri*.

Les deux nœuds du pédicule sont plus longs que larges et pourvus chacun d'une dent en dessous. Vu de dessus, le premier est rectangulaire, une fois et demie plus long que large, le second trapeziforme, plus étroit devant que derrière, à peine plus long que sa largeur postérieure. Les nœuds sont donc bien plus étroits et plus allongés que chez l'*E. crassicornis* et bien moins que chez l'*E. rogeri* et l'*E. angustatum*.

Entièrement, densément et finement réticulé-ponctué et mat, sauf les segments postérieurs de l'abdomen, qui sont subopaques et réticulés. La sculpture du thorax est aussi fine que celle de la tête. Scapes en outre finement ridés.

Corps et membres avec une pilosité brunâtre assez éparsée. Pubescence extrêmement espacée.

Entièrement d'un roux ferrugineux terne. Mandibules, antennes et devant de la tête plus foncés, plus brunâtres. Abdomen au contraire un peu plus clair (plus jaunâtre). Mais les différences de nuances sont peu accentuées.

Hab. COSTA RICA, Buenos Aires (*Pittier*).

Cette espèce paraît se rapprocher de l'*E. angustatum*, Roger, mais elle s'en distingue par ses funicules presque aussi épais que chez l'*E. crassicornis*, ses nœuds moins longs, sa taille plus petite, ses dents métanotales plus grandes, l'absence de carène médiane sur la face déclive assez large du métanotum, les arêtes frontales arquées devant, etc.

6. *Eciton angustatum*.

Eciton angustatum, Roger, Berl. ent. Zeitschr. vii. p. 204 (♀) (1863)¹; Wien. ent. Zeit. 1886, p. 116²; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 1³.

Hab. MEXIQUE, Baie de Campêche, Yucatan¹⁻³.

7. *Eciton rogeri*.

Eciton mexicanum, Roger, Berl. ent. Zeitschr. 1863, p. 205 (♂) (nec Smith, Norton)¹; Mayr, Wien. ent. Zeit. 1886, p. 117 (♂)²; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 38³.

Eciton rogeri, Dalla Torre, Wien. ent. Zeit. 1892, p. 89⁴; Cat. Hymen. vii. p. 6⁵; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxvi. p. 178, t. 2. figg. 6, a, b⁶.

Hab. MEXIQUE^{1 2 4 5 6}; GUATÉMALA², Retalhuleu (*Stoll*); COSTA RICA, Liberia (*Alfaro*³); PANAMA, Volcan de Chiriqui (*Champion*).—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, jusqu'à Paraguay^{5 6}.

8. *Eciton esenbecki*.

Labidus esenbeckii, Westw. Arcana Ent. i. p. 75, t. 20. fig. 4 (♂) (1842)¹; Smith, Cat. Hymen. vii. p. 7².

Eciton (Labidus) esenbecki, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 39³.

Hab. MEXIQUE, Teapa en Tabasco (*H. H. Smith*); COSTA RICA, Alajuela (*Alfaro*³) [♂]. —BRÉSIL^{1 2}.

9. *Eciton cæcum*.

Formica omnivora, Oliv. (nec Linn.), Encycl. Méthod., Ins. vi. p. 496 (♀) (1791) (excl. syn.)¹.

BIOL. CENTR.-AMÉR., Hymenopt., Vol. III., June 1899.