

- Eciton omnivorum*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxiii. p. 163²; *ibid.* xxvi. p. 179, t. 2. figg. 9 a-d³; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 5⁴.
Formica cæca, Latr. Hist. Nat. des Fourmis, p. 270, t. 9. fig. 56 (♀) (1802)⁵.
Nycteresia cæca, Roger, Berl. ent. Zeitschr. 1861, p. 22 (♀)⁶.
Eciton cæcum, Mayr, Wien. ent. Zeit. 1886, p. 119 (♀)⁷; Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. p. 553⁸; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. pp. 38, 39, nota⁹.
Eciton vastator, Smith, Journ. Ent. i. p. 71 (♀) (1860)¹⁰.
Eciton erratica, Smith, loc. cit. p. 71 (♀)¹¹; Bates, Nat. Amazons, ii. p. 358 (1863)¹².
Labidus servillei, Westw. Arcana Ent. i. p. 75, t. 20. figg. 2, 2 a (♂) (1842)¹³.
Eciton (Labidus) servillei (Westw.), var. *sayi*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 39 (♂) (1890)¹⁴.
Eciton latreillei (Jurine), var. *servillei*, Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 4¹⁵.
Eciton cæcum = *servillei* = *latreillei*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxviii. p. 4 (1896)¹⁶.

Hab. AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE, Texas^{3 4}.—MEXIQUE⁴, Presidio de Mazatlan, Ventanas (*Forrer*), Moyoapam (*Saussure*); HONDURAS BRITANNIQUE (*Blancaneaux*); GUATÉMALA, Panima et Purula en Vera Paz, Totonicapam, Las Mercedes, Paso Antonio, Capetillo (*Champion*) [♂ ♀], Tecpam (*Stoll*); NICARAGUA, Chontales (*Janson*); COSTA RICA³, Alajuela, Jiménez (*Alfaro*⁹) [♂ ♀], Volcan de Irazu (*Rogers*), San José (*Pittier*); PANAMA, Volcan de Chiriqui (*Champion*).—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE⁴, Ega^{11 12}, Pará¹³.

Cette espèce très commune vit dans la terre et chasse sous terre, comme le *Dorylus juvenculus* (*Forel*).

10. *Eciton prædator*.

- Formica omnivora*, Koll. dans Pohl's Reise Brasil. i. p. 114, fig. 11 (♀) (1832) (nec Oliv.)¹.
Eciton omnivorum, Mayr, Wien. ent. Zeit. 1886, p. 118 (♀)²; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 38³.
Eciton prædator, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 152 (♀) (1858)⁴; Belt, Nat. Nicaragua, pp. 17-29 (1874)⁵; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxvi. p. 180, t. 2. figg. 10 a-d⁶; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 5⁷.
Eciton tepeguas, Norton, Trans. Am. Ent. Soc. ii. p. 46 (♀) (1868)⁸.

Hab. MEXIQUE^{2 7}, Cordova (*Sumichrast*⁸, *Saussure*), Orizaba (*Sumichrast*, *H. H. Smith*); GUATÉMALA, Retalhuleu etc. (*Stoll*), Las Mercedes, Mirandilla (*Champion*); NICARAGUA⁷, Chontales (*Belt*); COSTA RICA, Jiménez, Alajuela (*Alfaro*³); PANAMA, Bugaba, Volcan de Chiriqui (*Champion*).—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE⁷, Ega⁴.

Cette espèce très commune chasse hors de terre, mais en se cachant autant que possible sous les feuilles, sous les troncs couchés etc. en Colombie (*Forel*).

Var. *ferrugineum*.

- Eciton tepeguas*, var. *ferruginea*, Norton, Trans. Am. Ent. Soc. ii. p. 46 (♀)⁹; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 5¹⁰.

Hab. MEXIQUE¹⁰, Cordova (*Sumichrast*⁹).