

11. **Eciton alfaroi.**

*Eciton alfaroi*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 39 (♂) (1890)<sup>1</sup>; ibid. xxvi. p. 183<sup>2</sup>.

*Hab.* COSTA RICA<sup>2</sup>, San José (*Alfaro*<sup>1</sup>).

12. **Eciton pilosum.**

*Eciton pilosum*, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 151 (♀) (1858)<sup>1</sup>; Mayr, Wien. ent. Zeit. 1886, p. 120<sup>2</sup>; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 39<sup>3</sup>; ibid. xxvi. p. 183<sup>4</sup>; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 5<sup>5</sup>.

*Eciton clavicornis*, Norton, Trans. Am. Ent. Soc. ii. p. 46 (♀) (1868)<sup>6</sup>.

*Hab.* MEXIQUE<sup>2 4 5</sup>, Cordova (*Sumichrast*<sup>6</sup>); GUATÉMALA<sup>2 5</sup>, Retalhuleu (*Stoll*); COSTA RICA, San Carlos (*Alfaro*<sup>3</sup>).—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, jusqu'à Paraguay<sup>4 5</sup>.

13. **Eciton sumichrasti.**

*Eciton sumichrasti*, Norton, Proc. Essex Institute, vi., Comm. p. 6, fig. (♀) (1868)<sup>1</sup>; Amer. Nat. ii. p. 62, t. 1. fig. 7<sup>2</sup>; Trans. Am. Ent. Soc. ii. p. 45<sup>3</sup>; Mayr, Wien. ent. Zeit. 1886, p. 120<sup>4</sup>; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 6<sup>5</sup>; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxvi. p. 183<sup>6</sup>.

*Hab.* AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE, Texas<sup>4</sup>.—MEXIQUE<sup>1-6</sup>, Orizaba (*Sumichrast*<sup>3</sup>, *Saussure*); GUATÉMALA<sup>4 5 6</sup>, Cerro Zunil, Quezaltenango (*Champion*), Antigua (*Stoll*); NICARAGUA<sup>4 5</sup>, Chontales (*Belt*).

14. **Eciton morosum.**

*Labidus morosus*, Smith, Cat. Hymen. vii. p. 6 (♂) (1859)<sup>1</sup>.

*Eciton morosum*, Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 4<sup>2</sup>.

*Hab.* MEXIQUE<sup>1 2</sup>, Atoyac en Vera Cruz (*Schumann*); HONDURAS<sup>2</sup>.

Var. *payarum*, n.

♂. Diffère du type par son pédicule beaucoup moins concave et à bord latéral bien plus obtus, moins proéminent, ne formant pas d'angle postérieur latéral distinct. Je ne trouve pas d'autre différence avec les exemplaires d'Atoyac et ce sont ces derniers que je dois considérer comme typiques, le type de Smith étant de Mexique, et la forme du pédicule correspondant bien à la description de Smith.

*Hab.* HONDURAS (*Staudinger*).

Reçu par M. le Prof. Emery.

15. **Eciton mexicanum.**

*Labidus mexicanus*, Smith, Cat. Hymen. vii. p. 7 (♂) (1859)<sup>1</sup>.

*Eciton mexicanum*, Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 4<sup>2</sup>.

*Eciton (Labidus) subsulcatum*, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvi. p. 440 (♂) (1886)<sup>3</sup>.

*Hab.* AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE, Texas<sup>2</sup>.—MEXIQUE<sup>2</sup>, Orizaba<sup>1</sup>, Atoyac en Vera Cruz (*H. H. Smith*).