

Hab. MEXIQUE, Presidio de Mazatlan (*Forrer*), Atoyac en Vera Cruz (*Schumann*); HONDURAS BRITANNIQUE (*Blancaneaux*); GUATÉMALA, Panzos en Vera Paz, Zapote, Pantaleon (*Champion*); HONDURAS, Ruatan I. (*Gaumer*); COSTA RICA (*Van Patten*), Volcan de Irazu (*Rogers*), Alajuela, Jiménez (*Alfaro*¹⁰); PANAMA (*Boucard*), Volcan de Chiriqui, Bugaba (*Champion*).—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, mais seulement dans le nord, jusqu'à l'Amazone.

Cette espèce fait de vastes nids plats, peu apparents. On ne voit guère sortir que les petites ouvrières moyennes de 5 à 7 millim. Les grosses sont fort distinctes et toujours cachées au fond du nid. Mais les jardins de champignons ne sont pas profonds et semblables à ceux de l'*A. sexdens*.

3. *Atta columbica*.

Atta columbica, Guér. Icon. Règne Anim., Ins. p. 422 (♀) (1845)¹; Forel, Bull. Soc. Vaud. Sci.

Nat. (2) xx. p. 362²; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 152³.

Ecodoma columbica, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 184⁴.

Atta lebasii, Guér. Icon. Règne Anim., Ins. p. 422 (♀) (nec Emery)⁵.

Ecodoma lebasii, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 184⁶.

Atta lebasii, var. *columbica*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 55⁷.

Hab. GUATÉMALA, Teleman et Chacoj en Vera Paz (*Champion*); COSTA RICA, Alajuela (*Alfaro*⁷); PANAMA².—COLOMBIE³.

Cette insecte est très voisine de l'*A. cephalotes* et n'en est probablement qu'une race ou variété.

4. *Atta fervens*.

Atta fervens, Say, Bost. Journ. Nat. Hist. i. p. 290 (1836)¹; Complete Writings, ii. p. 734²;

Forel, Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. (2) xx. p. 362³; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 152⁴.

Ecodoma mexicana, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 185, t. 10. fig. 20 (♀) (1858)⁵; Norton, Amer.

Nat. ii. p. 66, t. 1. figg. 9, 10 (♂ ♀)⁶; Proc. Essex Institute, vi., Comm. p. 9, fig.⁷; Moreno, La Naturaleza, iii. pp. 189, 190 (1876)⁸.

Myrmica (Atta) texana, Buckl. Proc. Acad. Phil. 1860, p. 233 (♂ ♀ ♂)⁹.

Ecodoma texana, Lincecum, Proc. Acad. Phil. 1867, pp. 24-31¹⁰.

Hab. AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE, Texas^{3 4 9 10}.—MEXIQUE^{1 2 4 5 7}, Presidio de Mazatlan, Ventanas en Durango, et environs de la ville de Mexique (*Forrer*), ?Tepic (*Eisen et Vasilit*), Cuernavaca en Morelos, Orizaba⁸ (*H. H. Smith*); HONDURAS BRITANNIQUE, R. Sarstoon (*Blancaneaux*); GUATÉMALA (*Stoll*³), San Isidro (*Champion*); PANAMA³, Volcan de Chiriqui 2000' à 3000' (*Champion*).—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, Colombie^{3 4}, Surinam³.

M. Pergande indique l'*Atta lævigata*, Smith, comme trouvée à Tepic; mais je suis persuadé qu'il a confondu cette forme avec les ♂ major de l'*A. fervens*, qui ont aussi la tête luisante.