

2. *Cyphomyrmex championi*, sp. n. (Tab. III. fig. 3, ♂.)

♂. Long. 3.5 millim. Les arêtes entre les deux ocelles latéraux fort élevées. À chaque angle postérieur de la tête, une épine recourbée en avant, pointue, bien plus longue que la largeur de sa base et que celles du *C. auritus* ♂. Pronotum armé devant, de chaque côté, d'une épine triangulaire, aiguë, un peu plus longue que la largeur de sa base, bien plus grande que chez le *C. auritus*. Scapes avec un renflement fusiforme à leur 2^{me} moitié, dépassant l'occiput de plus d'un tiers de leur longueur. Du reste semblable au *C. rimosus*, mais bien plus grand. Métanotum inerme; face basale plus longue que la face déclive. Mat. Abdomen subopaque. Sculpture et pubescence squameuse, comme chez le *C. rimosus*. D'un noir brunâtre; antennes, pattes et ailes brunes; mandibules d'un brun jaunâtre.

Hab. PANAMA, Volcan de Chiriqui (*Champion*).

3. *Cyphomyrmex flavidus*.

Cyphomyrmex flavidus, Pergande, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) v. p. 895 (♀) (1895)¹.

Hab. MEXIQUE, Santiago Ixcuintla, Tepic (*Eisen et Vasil*¹).

2^{me} Tribu DACETII.

Les *Daceti* vivent en général dans les troncs pourris. Ils sont lents, font les morts, comme les derniers genres des *Atti*, avec lesquels ils ont diverses affinités. Mais ils ne font pas de jardins de champignons, et la tribu est répandue dans tous les continents.

RHOPALOTHRIX.

Rhopalothrix, Mayr, Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, lxi. p. 415 (1870).

1. *Rhopalothrix godmani*, sp. n. (Tab. III. fig. 4, ♀.)

♀. Long. 3.3 millim. Antennes de 8 articles. Tête assez déprimée, nullement convexe, ni tronquée devant (ce qui la distingue de toutes des autres espèces); mais, vu de côté, le front est faiblement concave. La tête est en trapèze, fortement élargie derrière, avec les côtés presque droits, très divergents et le bord postérieur presque droit aussi, faiblement et largement concave. Un côté de la tête est plutôt plus long que son bord postérieur. Mandibules triangulaires, à bord externe rectiligne, armées de 7 dents longues, pointues et serrées; les mandibules sont régulièrement ponctuées. Bord antérieur de l'épistome déprimé, rectiligne. Scapes avec une rangée d'assez longs poils-massues. Thorax presque aussi large que la tête. Les épines du métanotum sont larges et comprimées, en partie translucides, mais triangulaires et assez pointues (pas en lobe comme chez le *R. iheringi*). Les nœuds du pédicule sont plus larges que longs, le premier cubique et plan dessus, comme chez le *R. iheringi*, à peine moins anguleux. Abdomen ovale.

Abdomen finement, mais abondamment et régulièrement ponctué, assez luisant. Tête subopaque, grossièrement ponctuée derrière; devant, les points passent à des rides longitudinales; tête luisante entre les points. Derrière de l'occiput lisse et luisant. Pronotum ridé en travers; mésonotum ridé en long; côtés en partie lisses. Comme la tête, le thorax est luisant entre la sculpture, en somme subopaque. Nœuds du pédicule densément ponctués et subopaques.

Quelques poils-massues dressés, extrêmement épars sur le corps et jaunâtres. Pubescence très éparse, visible sur la tête, jaunâtre, de forme ordinaire, mais assez épaisse. Pattes avec des poils adjacents seulement.

D'un roux clair assez vif; pattes, antennes et mandibules d'un roux jaunâtre.

Ailes poilues, teintées de roussâtre.

Hab. PANAMA, David en Chiriqui (*Champion*).