

## STRUMIGENYS.

*Strumigenys*, Smith, Journ. Ent. i. p. 71, t. 4. figg. 6, 7 (1860); Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 145.

*Labidogenys*, Roger, Berl. ent. Zeitschr. vi. p. 249, t. 1. fig. 17 (1862).

*Pyramica*, Roger, loc. cit. p. 251, t. 1. fig. 18 (1862).

*Cephaloxys*, Smith, Journ. Linn. Soc., Zool. viii. p. 76, t. 4. fig. 5 (1864).

*Trichoscapa*, Emery, Ann. Accad. Nat. Napoli (2) ii. p. 24 (1869).

1. *Strumigenys cordovensis*.

*Strumigenys cordovensis*, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. pp. 569, 573 (♂) (1887)<sup>1</sup>; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 146<sup>2</sup>.

*Hab.* MEXIQUE<sup>1 2</sup>.

2. *Strumigenys elongata*.

*Strumigenys elongata*, Roger, Berl. ent. Zeitschr. 1863, p. 212 (♂)<sup>1</sup>; Forel, Mittheil. Schweiz. ent. Ges. vii. p. 217<sup>2</sup>; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 146<sup>3</sup>.

*Hab.* PANAMA<sup>1 2 3</sup>.

3. *Strumigenys unispinulosa*.

*Strumigenys unispinulosa*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. pp. 55, 67 (♂ ♀), t. 7. fig. 5 (1890)<sup>1</sup>; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 147<sup>2</sup>.

*Hab.* COSTA RICA<sup>2</sup>, Alajuela (*Alfaro*<sup>1</sup>).

4. *Strumigenys godmani*, sp. n. (Tab. III. fig. 5, ♀.)

♀. Long. 5.4 millim. Mandibules longues comme la moitié de la tête, n'ayant qu'un bord externe et un bord interne (type de la *S. smithi*), mais larges, un peu déprimées, arquées, avec le bord externe très convexe, surtout vers l'extrémité, et le bord interne concave, ayant vers son milieu deux longues dents pointues, dont celle de derrière se continue en arrière par un mince rebord, un peu translucide. Les mandibules se terminent en outre par deux longues dents, dont l'inférieure est bifide. La tête, assez déprimée, est extrêmement élargie et très profondément échancrée derrière, comme chez les *S. chyeri* et *S. grandidieri*, c'est à dire, comme bilobée, mais il n'y a pas d'incisure latérale comme chez la *S. grandidieri*. Les deux lobes postérieurs de la tête sont fortement déprimés, le vertex et le front seuls formant une convexité médiocre. Le sillon frontal s'étend jusque derrière les ocelles. Thorax court. Mésonotum fort élevé, plus large que long, sans le scutellum. Face basale du mésonotum subbordée, à peine plus longue que large, presque carrée, plus longue que la face déclive. Cette dernière est bordée de quatre épines de même longueur, dont les deux métasternales sont plus grêles et plus pointues que les métanotales. Les épines sont reliées par une arête, mais n'ont pas de membrane.

Premier nœud du pédicule arrondi, rétréci et très longuement pétiolé devant. Second nœud très large, presque comme la moitié de l'abdomen, à peine plus long que large. Les deux nœuds entourés de membranes spongieuses, comme chez les autres espèces. Abdomen ovale, pointu à l'extrémité. Pattes et antennes longues et grêles.

Mandibules coriaces à la base, du reste lisses et luisantes, ainsi que l'abdomen. Tout le reste du corps, y compris les pattes et les scapes, fortement et densément réticulé-ponctué et mat. La tête et le thorax ont en outre des rides ou rugosités assez grossières et irrégulières.

Pilosité dressée éparse, jaunâtre, longue et pointue, sauf sur la tête et le thorax, où les quelques soies sont raides et obtuses; elle est nulle sur les scapes et les tibias. Pubescence jaunâtre, espacée, pointue et assez