

longue sur les membres et sur les mandibules, squamiforme sur la tête et le thorax, nulle sur l'abdomen et le pédicule.

D'un roux ferrugineux foncé; vertex et abdomen brunâtres.

Hab. PANAMA, Volcan de Chiriqui (*Champion*).

3^{me} Tribu CRYPTOCERII.

PROCRYPTOCERUS.

Procryptocerus, Emery, Ann. Mus. Genova, xxv. p. 470, nota (1887); Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 139.

Les *Procryptocerus* vivent dans des cavités végétales. M. Urich m'a envoyé un charmant nid du *P. spiniperdus*, sp. n.*, sculpté dans la large base d'une épine

* Description de quelques nouvelles espèces de *Procryptocerus* d'autres régions :—

Procryptocerus mayri, sp. n.

♂. Long. 7.5 à 7.7 millim. Mandibules luisantes, ponctuées et ridées ou striées, avec quelques dents. Epistome échancré devant, au milieu, avec la strie médiane un peu plus forte. Aire frontale visible, striée. Les coins postérieurs de la tête n'ont qu'un angle, qui n'est pas ou est à peine dentiforme. La troncature occipitale n'est pas concave; elle n'est pas très distinctement bordée, mais obliquement striée; les stries de l'occiput s'y continuent en partie au milieu. Le pronotum a des épaules anguleuses, sans dent. Suture pro-mésonotale assez nette. Le mésonotum forme de côté une dent obtuse. Les épines du métanotum sont horizontales, très longues, aussi longues que la face basale, légèrement sinueuses, à peine divergentes. Premier nœud du pédicule une fois et demie plus long que large, au moins aussi large derrière que devant; second nœud aussi long que large, élargi derrière. Abdomen ovale. Une impression longitudinale, large sur l'occiput. Cuisses renflées.

Tête, thorax et pédicule luisants, grossièrement ridés-réticulés longitudinalement en dessus, et fortement striés en long sur les côtés (sauf le pédicule, qui est aussi rugueux sur les côtés). L'épistome, l'aire frontale, le front et les joues sont seulement striés-ridés en long. La face déclive du métanotum est ridée en long. Abdomen luisant, extrêmement finement et faiblement réticulé avec des points épars piligères, sans trace de stries ni de rides.

Tout le corps et les membres hérissés d'une pilosité dressée très fine et pointue, d'un jaunâtre pâle.

Noir. Cuisses, tibias (sauf la base) et scapes rouges. Tarses et extrémité des funicules brunâtres.

Hab. COLOMBIE (*Landolt, coll. Forel*).

Procryptocerus batesi, sp. n.

♂. Long. 5.6 millim. Mandibules comme le précédent, mais l'aire frontale n'est pas visible, l'épistome n'est pas délimité en arrière et très convexe. La troncature occipitale est tout-à-fait indistincte et grossièrement réticulée-ponctuée, comme le reste de l'occiput. Les angles postérieurs de la tête ont une forte dent recourbée en dehors, et, devant cette dent, un feston. Le thorax est comme chez le *P. carbonarius*. Le premier nœud du pédicule est au moins aussi large que long, le second seulement un peu plus large que long. L'abdomen est entièrement lisse et luisant, ovale (elliptique chez le *P. carbonarius*). Du reste, sculpture, pilosité, forme et couleur du *P. carbonarius*. Mais il est bien plus grand et se distingue par la troncature occipitale qui, chez le *P. carbonarius*, est très distinctement bordée et presque lisse et luisante (avec de faibles rides longitudinales), contrastant fortement avec les profondes rugosités du reste de l'occiput. Les côtés du thorax sont ridés-réticulés et non pas striés comme chez le *P. mayri*.

Hab. COLOMBIE (*Landolt, coll. Forel*).

Procryptocerus spiniperdus, sp. n.

♂. Long. 5.8 à 7.0 millim. Mandibules subopaques, striées et très finement réticulées-ponctuées, armées de