

d'*Erythrina umbrosa* à Trinidad. Les ♀ sortaient par un petit trou rond, mais à l'intérieur elles avaient sculpté quelques belles cases spacieuses. (Tab. II. fig. 8.)

1. *Procryptocerus pictipes*.

Procryptocerus pictipes, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxviii. p. 66 (♀) (1896)¹.

Hab. COSTA RICA, Jiménez (*Alfaro*¹).

2. *Procryptocerus paleatus*.

Procryptocerus paleatus, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxviii. p. 65 (♀) (1896)¹.

Hab. COSTA RICA, Jiménez (*Alfaro*¹).

3. *Procryptocerus striatus*.

Meranoplus striatus, Smith, Journ. Ent. i. p. 77, t. 4. fig. 1 (♀) (1860)¹.

5 à 6 dents peu distinctes. Épistome largement échancré devant, à limite postérieure visible, faiblement convexe. Aire frontale indistincte. Articles du funicule un peu plus longs que larges, sauf le second. Angles postérieurs de la tête avec une petite dent recourbée. Troncature occipitale fortement concave, lisse et luisante, avec un fort rebord antérieur qui forme le bord occipital de la tête et qui est crénelé. La tête est moins convexe que chez le *P. puncticeps*. Le pronotum est fortement élargi devant et subdéprimé, moins convexe et plus large que chez les autres espèces, même que chez le *P. striatus*, i. sp. Le dos du thorax est bordé d'un rebord aigu et surplombant les côtés bien plus fort que chez les autres espèces. Les épaules très marquées du pronotum forment de chaque côté deux petits angles dentiformes rapprochés. Le pronotum est en trapèze, plus de deux fois plus large que long, terminé de côté, derrière, par un angle droit. Suture pro-mésonotale assez nette. Mésenotum avec une forte dent latérale faisant marche d'escalier avec l'angle postérieur du pronotum. Le bord latéral du métanotum a deux dents recourbées en arrière. Les épines métanotales sont assez longues, peu divergentes, dirigées en arrière et un peu en haut. Suture meso-métanotale très profonde, formant de côté une profonde incision du bord. Le dos du métanotum est plus bas que celui du mésenotum. Premier nœud du pédicule à côtés parallèles, une fois et demie plus long que large. Second nœud une fois et un tiers plus large que long. Abdomen ovale. Cuisses renflées.

Dessus de la tête subopaque, grossièrement, mais assez superficiellement réticulé-ridé en long, avec de larges mailles, dont le fond est très finement réticulé. Côtés et devant de la tête longitudinalement ridés. Dos du thorax, abdomen, cuisses antérieures et côtés du pronotum ainsi que le bas des côtés du métanotum longitudinalement striés, avec le fond des stries finement réticulé et plus ou moins subopaque; sur l'abdomen, cette sculpture est plus fine et plus serrée, les fines réticulations plus fortes. Scapes très finement réticulés-ponctués et mats. Nœuds du pédicule et tibiae grossièrement rugueux. Cuisses postérieures, reste des côtés du thorax, face déclive du métanotum et troncature occipitale lisses et luisants.

Tout le corps et les membres recouverts d'une pilosité jaunâtre pâle, épaisse, raide, assez abondante, sétiforme, brillante qui, sur l'abdomen, devient adjacente, ce qui, avec la sculpture, donne à l'insecte un aspect gris soyeux.

Noir; extrémité des tarses, des funicules et de l'abdomen à peine brunâtres.

♂. Long. 8 millim. Étroit et allongé. Antennes filiformes. Scapes de la longueur du 2^{me} article du funicule. Premier article du funicule très court, presque globuleux. Mandibules perpendiculairement tronquées à l'extrémité, coudées à angle droit au milieu, aussi larges à l'extrémité qu'à la base, à bord terminal à peine denticulé. Épistome convexe, subcaréné. Tête plus large que longue, arrondie derrière. Pronotum avec deux épaules anguleuses. Métanotum avec deux dents épaisses. Les deux nœuds du pédicule très allongés, lentement élargis en arrière, le premier trois fois plus long que large. Abdomen très allongé, presque cylindrique, atténué à sa base. Cuisses un peu renflées au milieu. Valvules