

4. *Procryptocerus belti*, sp. n. (Tab. III. fig. 6, ♂.)

♀. Long. 3·7 à 3·8 millim. Mandibules finement et densément striées-ridées. Épistome avec une fine carène médiane, échancré au milieu de son bord antérieur. Articles 2 à 7 des funicules aussi larges que longs. Tête convexe, avec une très petite dent assez cachée à l'angle postérieur. La troncature occipitale est assez lisse et luisante, non concave. Thorax assez fortement étranglé et incisé entre le mésonotum et le métanotum. Sauf au métanotum, le dos du thorax n'est qu'obtusément bordé. Le pronotum a de chaque côté, devant, et le mésonotum de côté, une très petite dent semblable à celle du derrière de la tête. Le métanotum n'a devant qu'un feston. Les épines du métanotum sont longues, grêles, médiocrement divergentes, dirigées en arrière et en haut. Premier nœud du pédicule plus long que large, un peu élargi devant; second nœud deux fois plus large que long. Abdomen elliptique comme chez les autres espèces. Cuisses assez renflées.

Épistome et front faiblement ridés en long, subopaques. Dessus de la tête, du thorax et des nœuds du pédicule profondément et grossièrement réticulés-ponctués, avec le fond des mailles luisant. Sur le métanotum et un peu sur le derrière du mésonotum, les mailles se transforment en rides longitudinales. Côtés du thorax et dessous de la tête longitudinalement striés. Abdomen et scapes finement et densément réticulés-ponctués et mats. Pattes faiblement réticulées et luisantes.

Tête, thorax, pattes et scapes assez abondamment couverts d'une pilosité dressée obtuse (comme coupée à l'extrémité), assez fine, raide, d'un jaune pâle et assez courte. Sur le pédicule et l'abdomen la pilosité devient bien plus longue et plus pointue; sur l'abdomen elle est presque adjacente, légèrement dorée ou argentée (entre deux).

Noir. Pattes, sauf les hanches, scapes et extrémité des mandibules, d'un rouge jaunâtre. Funicules, genoux et 1^{er} article des tarses brunâtres.

Les exemplaires de Nicoya, Costa Rica, sont un peu plus grands (3·7 millim.), ont les poils couchés de l'abdomen plus longs et plus marqués, et les épines du métanotum un peu plus longues. La troncature de l'occiput a aussi chez eux des stries longitudinales.

♀. Long. 4·5 millim. Thorax plus étroit que la tête. Le mésonotum et le scutellum sont grossièrement et densément réticulés, en partie réticulés-ponctués avec direction longitudinale. Les épines du métanotum sont un peu plus courtes et plus obtuses que chez l'ouvrière. L'abdomen est plus allongé que chez l'ouvrière. Du reste comme l'ouvrière. Ailes brunâtres; tache marginale grande et brune; cellule radiale courte.

♂. Long. 5 à 5·5 millim. Mandibules grandes, triangulaires, larges, à bord externe convexe, à bord interne droit, tranchant, un peu translucide, avec une petite dent terminale pointue. Épistome fortement échancré au milieu de son bord antérieur et peu convexe. Les yeux—plutôt petits—sont un peu en avant du milieu des côtés. À leur bord interne se trouve une rainure un peu effacée, mais pourtant fort visible pour les scapes. Tête (sans les mandibules) aussi large que longue, à bord postérieur un peu marqué (pas tout-à-fait arrondi). Scapes courts. Les articles du funicule sont épais, renflés au milieu, au moins deux fois plus longs que larges. Le thorax est étroit. Le métanotum a deux petites épines grêles, presque parallèles, beaucoup plus courtes que l'intervalle de leurs bases. Premier article du pédicule subcylindrique, deux fois plus long que large. Second article assez rectangulaire, 1½ fois plus long que large. Abdomen moins étroit et moins allongé que chez le *P. spiniperdus*.

Grossièrement ponctué, avec les points serrés sur la tête et espacés sur le thorax. Abdomen, pédicule et côtés du thorax lisses et luisants. Face basale du métanotum ridée en long. La tête est subopaque, finement réticulée-ponctuée entre les gros points.

Corps assez abondamment recouvert d'une pilosité pointue, fine, d'un roux jaunâtre. Les tibias et les antennes n'ont guère qu'une pubescence adjacente et quelques poils obliques.

Noir. Antennes, mandibules et extrémité de l'abdomen brunes. Pattes d'un brun jaunâtre. Ailes comme chez la ♀.

Hab. COSTA RICA, Nicoya (*Alfaro*) [♀ ♀ ♂]; PANAMA, Bugaba (*Champion*) [♂].

Cette charmante petite espèce est très distincte de toutes les autres, tant par sa forme que par sa sculpture etc.