

5. *Procryptocerus carbonarius*.

Cataulacus carbonarius, Mayr, Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, lxi. p. 413 (♂) (1870)¹.

Procryptocerus carbonarius, Emery, Ann. Mus. Genova, xxv. p. 470, nota (1887)².

Hab. AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, Colombie, Brésil^{1 2}.

Var. *laeviventris*, n.

♂. Long. 4.5 millim. Mandibules avec quelques rides et points assez grossiers, du reste assez luisantes. Épistome très largement ou à peine échancré à son bord antérieur, avec une très faible carène médiane. Comme chez le précédent, la tête est fort convexe et la troncature occipitale non concave; cette dernière est luisante, avec des rides longitudinales espacées. Une très petite dent aux angles postérieurs de la tête. Dos du thorax un peu plus nettement bordé que chez le *P. belti*, angles antérieurs du pronotum presque sans dent. Pas d'étranglement entre le mésonotum et le métanotum; la suture est seulement fortement imprimée, comme chez les autres espèces, sauf le *P. belti*, et le bord du dos du thorax y a une profonde échancrure. Le mésonotum a de côté une petite dent, le métanotum devant à peine un feston. Épines métanotales fortes, assez longues, presque horizontales, un peu divergentes, très légèrement sinueuses. Premier nœud du pédicule un peu plus long que large, également rétréci devant et derrière; second nœud distinctement plus large que long; les deux nœuds ont les côtés convexes. Abdomen elliptique; cuisses renflées.

Devant de la tête, côtés de la tête et dos du métanotum longitudinalement et grossièrement ridés. Derrière de la tête, nœuds du pédicule, dos du métanotum et du pronotum grossièrement réticulés. Mais il y a du mélange entre la sculpture ridée et la sculpture réticulée, tant sur la tête que sur le thorax; le fond des rides et des mailles est luisant. Côtés du thorax striés en long. Les scapes sont densément réticulés-punctués, mats, et en outre grossièrement ridés en long. L'abdomen est lisse et luisant, çà et là avec des vestiges de réticulations; seulement sa base a des rides longitudinales.

Sur tout le corps et sur tous les membres une pilosité dressée jaunâtre, fine, pointue, qui est un peu plus courte sur le dos de l'abdomen, du reste de longueur moyenne.

Noir. Extrémité des mandibules, des funicules et des tarses, ainsi que les articulations, brunâtres.

Hab. PANAMA, Volcan de Chiriqui (*Champion*).

Les épines du métanotum sont parallèles chez la forme typique de Colombie, et la moitié antérieure de l'abdomen est striée. Elle est aussi un peu plus petite.

Le *P. carbonarius* ayant été assez insuffisamment décrit, et M. Emery l'ayant dans le temps confondu avec son *P. clathratus*, notre description de cette variété ne sera pas de trop.

6. *Procryptocerus puncticeps*.

Meranoplus puncticeps, Smith, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 610, t. 11. fig. 10 (♂)¹.

Procryptocerus puncticeps, Emery, Ann. Mus. Genova, xxv. p. 470, nota (1887)².

Hab. AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, Brésil^{1 2}.

Race *impressus*, n.

♂. Long. 5.5 millim. Plus grand que la forme typique de Para. La tête est plus luisante et a des rides beaucoup plus accentuées sur toute sa surface entre les points, qui sont un peu moins apparents, tout en étant espacés et fort distincts. Le mésonotum est fortement imprimé en soucoupe sur toute sa partie médiane jusqu'à la suture méso-métanotale. Le second nœud du pédicule est plus large, beaucoup plus large que long. L'abdomen est densément réticulé-punctué et seulement faiblement strié en outre, tandis que chez le *P. puncticeps* il est surtout densément strié. La grosse et longue pubescence sétiforme dorée qui recouvre l'abdomen, le pédicule et le métanotum, est plus abondante. Enfin le bord postérieur de la tête est distinctement crénelé, ce qui n'est pas le cas chez le *P. puncticeps*. La patrie des deux formes étant en outre fort différente, je crois l'établissement de cette race justifié.