

Quelques mâles de Teapa en Tabasco (*H. H. Smith*) appartenaient peut-être à cette forme du *C. multispinosus*?

15. *Cryptocerus pallens*.

Cryptocerus pallens, Klug, Entom. Monogr. p. 206 (♀) (1824)¹; Smith, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) ii. p. 218 (1854)²; ibid. (3) i. p. 411³; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 143⁴; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxvi. p. 212, t. 4. figg. 29–32 (♂ ♀) (1894)⁵.

Cryptocerus discocephalus, Smith, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) ii. p. 222, t. 20. fig. 2 (♂) (1854)⁶; ibid. (3) i. p. 410 (♂ ♂), t. 11. figg. 1–3⁷; ibid. 1876, p. 608 (♂ ♀ ♂)⁸; Cat. Hymen. vi. p. 191, t. 11. figg. 1 (♂), 2, 3 (♂ ♀)⁹.

Var. *Cryptocerus araneolus*, Smith, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) ii. p. 223, t. 19. fig. 4 (♂) (1854)¹⁰; (3) i. p. 411¹¹.

Hab. MEXIQUE^{1 4}; GUATÉMALA, El Reposo, Pantaleon (*Champion*); COSTA RICA^{4 10}.—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, Brésil^{1–9}; ANTILLES, Cuba⁴, Jamaïque (*Forel*), St. Vincent^{8 10 11}.

N.B. La variété *C. araneolus* est celle des Antilles.

16. *Cryptocerus pallidicephalus*.

Cryptocerus pallidicephalus, Smith, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 606, t. 11. fig. 5 (♀)¹; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 143².

Hab. MEXIQUE^{1 2}.

17. *Cryptocerus scutulatus*.

Cryptocerus scutulatus, Smith, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) v. p. 524, t. 26. figg. 3, 3a (♂) 1867)¹; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 144².

Hab. MEXIQUE^{1 2}.

18. *Cryptocerus setulifer*.

Cryptocerus setulifer, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxvi. p. 211, t. 4. figg. 34–37 (♂ ♀) (1894)¹.

Hab. COSTA RICA, Jiménez (*Alfaro*)¹.

19. *Cryptocerus umbraculatus*. (Tab. III. figg. 13, 13a, ♂; 14, ♀; 15, ♀; 16, ♂.)

Cryptocerus umbraculatus, Fabr. Syst. Piez. p. 420 (♂) (1804)¹; Klug, Entom. Monogr. p. 210 (♂ ♀) (1824)²; Smith, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) ii. p. 219 (1854)³; ibid. (3) i. p. 411⁴; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. pp. 55, 72 (♂ ♀), t. 9. figg. 1, 1a–e (1890)⁵; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 144⁶.

Cryptocerus quadriguttatus, Guér. Icon. Règne Anim., Ins. p. 425 (♂) (1845)⁷; Smith, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) ii. p. 217 (♂) (1854)⁸; ibid. (3) i. p. 409⁹.

Cryptocerus elegans, Smith, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) ii. p. 222, t. 19. fig. 3 (♂) (1854)¹⁰; (3) i. p. 410 (1862)¹¹.

Cryptocerus flavomaculatus, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xii. p. 757 (♀) (1862)¹².

Hab. MEXIQUE, Acapulco en Guerrero (*H. H. Smith*); GUATÉMALA, El Reposo,