

♂. Long. 7.3 millim. *Mandibules triangulaires, striées, luisantes, armées de 4 à 5 dents pointues.* Tête rétrécie derrière les yeux, mais avec un bord postérieur assez droit. *Épistome et aire frontale comme chez l'ouvrière.* Antennes de 13 articles. *Le scape est long comme le 2<sup>me</sup> article du funicule, dont les articles sont longs, grêles et subégaux, sauf le premier qui est à peine plus long que large. Le 2<sup>me</sup> article du funicule est plus épais que les autres. Mésonotum sans lignes convergentes. Métanotum abaissé (comme chez les *Aphænogaster*), absolument inerme, arrondi; la face basale à peu près deux fois plus longue que la face déclive, qui est faiblement imprimée ou concave au milieu.* Premier article du pédicule fort allongé; son pétiole passe insensiblement au nœud. Second nœud une fois et un tiers plus long que large, atténué et abaissé devant. Abdomen en ovale très allongé. *Crochets des tarsi simples. Ailes larges, avec une seule cellule cubitale. Cellule radiale ouverte. Pas de cellule discoïdale. La nervure cubitale ne se bifurque pas, c'est à dire que son rameau inférieur manque.*

Quelques rides sur les joues. Tout le reste du corps lisse et luisant, couvert d'une pilosité jaunâtre, courte, fine, pointue, çà et là oblique, tout-à-fait oblique et subadjacente sur les pattes et les antennes.

D'un roux jaunâtre; pattes et antennes testacées; moitié postérieure de l'abdomen plus ou moins brunâtre.

*Hab.* COSTA RICA <sup>1 2</sup>; PANAMA, Volcan de Chiriqui (*Champion*) [ ♀ ♂ ].

N.B.—Les parties italiques de la description doivent être considérées comme donnant provisoirement la caractéristique du genre, dont aucun ♂ n'avait été décrit jusqu'ici.

## 2. *Megalomyrmex modestus*.

*Megalomyrmex modestus*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxviii. p. 62 ( ♀ ) (1896) <sup>1</sup>.

*Hab.* COSTA RICA, Jimenez (*Alfaro* <sup>1</sup>).

Dans un tronc pourri.

## APHÆNOGASTER.

*Aphænogaster*, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, iii. p. 106 (1853); Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 98.

Subgen. *Ischnomyrmex*, Mayr, op. cit. xii. p. 738 (1862).

Subgen. *Messor*, Forel, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. xxxiv. p. lxx (1890).

[1. Sous-gen. APHÆNOGASTER, sensu strictiore.]

### [1. *Aphænogaster patruelis*.

*Aphænogaster patruelis*, Forel, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. xxx. p. xli ( ♀ ) (1886) <sup>1</sup>.

*Hab.* BASSE CALIFORNIE, Ile de Guadalupe, vers la côte pacifique du Mexique (*McCook* <sup>1</sup>).

Race *carbonaria*.

*Aphænogaster carbonaria*, Pergande, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) iv. p. 163 (1894) <sup>2</sup>.

*Hab.* BASSE CALIFORNIE, Sierra Laguna et El Chinche (*Eisen* <sup>2</sup>).

Cette forme diffère de l'*A. patruelis* par une nuance un peu plus foncée, une taille un peu plus grande, les rides de la tête un peu plus fortes, la face basale du métanotum moins convexe, les dents du métanotum encore plus obsolètes et le nœud du 1<sup>er</sup> article du pédicule un peu plus mince et un peu plus élevé. Ce ne sont que des différences graduelles qui justifient tout au plus une race.]