

elle se rétrécit insensiblement pour former à l'articulation occipitale un cou très court et assez large, suivi d'une collerette relevée, articulaire. La partie postérieure, rétrécie de la tête a ses côtés presque rectilignes (à peine convexes, mais convergents); le cou est plus large que chez l'*A. phalangium*. Yeux très convexes, en avant du milieu. Épistome sans échancrure ni carène, peu convexe. Aire frontale triangulaire. Arêtes frontales convergentes. Les scapes dépassent l'articulation occipitale d'un quart de leur longueur. Articles du funicule très longs et cylindriques, vont en se raccourcissant vers l'extrémité qui ne forme pas de massue appréciable. Pronotum très faiblement convexe. De son bord postérieur aux épines du métanotum, le profil du dos du thorax forme une seule large concavité un peu bosselée, assez faible, mais très distincte. Les sutures sont peu marquées, la suture méso-métanotale est presque obsolète. Le métanotum est armé de deux longues et robustes épines divergentes, dirigées en arrière et en haut, presque longues comme la face basale du métanotum et très pointues. Premier nœud du pédicule avec un large pétiole devant, en cône obtus, dont le pan antérieur est de beaucoup le plus court. Second nœud pyriforme, plus long que large. Pattes et antennes très longues et très grêles.

Transversalement strié. Face déclive du métanotum et abdomen lisses et luisants, sauf la base de ce dernier, qui est finement réticulée et subopaque ainsi que les deux nœuds du pédicule. Du vertex à la bouche, la tête est longitudinalement ridée et finement réticulée-punctuée entre les rides, subopaque. Les rides transversales de l'occiput se contournent en avant de chaque côté du vertex et deviennent longitudinales. Les rides de l'épistome sont arquées, avec leur concavité en arrière.

Sur le corps, des soies obtuses, raides, courtes, jaunâtres, éparses, la plupart obliques. Sur les pattes et les scapes, elles sont plus abondantes, mais tout-à-fait obliques, presque entièrement adjacentes.

D'un rouge ferrugineux terne; abdomen noirâtre.

Hab. MEXIQUE, Michoacan.

Reçue par M. le Prof. Emery.

7. *Aphænogaster (Ischnomyrmex) araneoides*.

Aphænogaster araneoides, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 48, t. 5. fig. 8 (♀) (1890)¹; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 98².

Hab. COSTA RICA², Alajuela, Jiménez (*Alfaro*¹).

Var. *inermis*, n.

♀. Long. 5.8 à 6.5 millim. Diffère de la forme typique par l'absence totale de dents au métanotum, qui est comme celui de l'*A. phalangium*, par sa tête moins rétrécie derrière (comme celle de l'*A. phalangium* d'après la figure d'Emery), par sa taille plus petite et par sa couleur d'un ferrugineux jaunâtre-roussâtre, plus clair (plus rougeâtre chez l'*A. araneoides* typique).

♂. Mêmes différences relatives. Long. 5.7 millim.

Hab. COSTA RICA (*Tonduz*) [♀]; PANAMA, Bugaba (*Champion*) [♀ ♂].

L'exemplaire ♀ de Bugaba est un peu plus grand que ceux de Costa Rica.

8. *Aphænogaster (Ischnomyrmex) cockerelli*.

Aphænogaster (Ischnomyrmex) cockerelli, André, Rev. d'Ent. 1893, p. 150 (♀)¹.

Hab. MEXIQUE, Montezuma, Etat de Chihuahua (*Cockerell*¹).

9. *Aphænogaster (Ischnomyrmex) mexicana*.

Ischnomyrmex mexicanum, Pergande, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) p. 893 (1895)¹.

Hab. MEXICO, Tepic (*Eisen et Vasil*¹).