

Myrmica dans les États du sud des États Unis. Il n'y a qu'une possibilité, c'est que ce soit une forme de hautes montagnes propagée en Mexique par les Montagnes Rocheuses. L'avenir le montrera.

PHEIDOLE.

Pheidole, Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. vi. p. 87 (1841).

Leptomyrma, Motschulsky, Bull. Mosc. xxxvi. p. 17 (1863).

Æcophthora, Heer, Hausameise Madeiras, p. 15 (1852).

Les espèces de ce genre immense vivent partout, dans la forêt, dans les savannes, dans les jardins cultivés, même dans les maisons (*P. megacephala*), et nichent dans la terre dont elles sortent par de petits cratères, ou dans le bois (trunks pourris). On voit surtout les ♂ courir partout et s'attaquer à tout, tandis que les soldats à grosse tête demeurent le plus souvent dans le nid, surtout ceux des espèces très dimorphes, où le soldat a la tête particulièrement énorme. Toutes les *Pheidole* ont un soldat (♂) tout-à-fait distinct de l'ouvrière.

1. *Pheidole absurda*. (Tab. III. fig. 19, ♂.)

Pheidole absurda, Forel, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. xxx. p. xlvii (♂) (1886)¹; Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. p. 594²; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 48, t. 5. figg. 9-11 (♂ ♂)³; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 88⁴.

Hab. GUATÉMALA, Retalhuleu (*Stoll*¹), Torola (*Champion*) [♂]; COSTA RICA, Alajuela, San José, Liberia (*Alfaro*³).

2. *Pheidole biconstricta*.

Pheidole biconstricta, Mayr, Sitzungsber. Akad. Wiss. lxi. p. 399 (♂ ♂) (1870)¹; Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xx. pp. 980, 983 (♂ ♀) (1870)²; ibid. xxxvii. pp. 589, 600 (♂ ♀) (1887)³.

Hab. COLOMBIE¹⁻³.

Race *bicolor*.

Pheidole biconstricta (Mayr), r. *bicolor*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 50 (♂ ♀) (1890)⁴.

Pheidole bicolor, Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 88⁵.

Hab. COSTA RICA (*Alfaro*⁴), Tuis (*Pittier*).

Race *rubicunda*.

Pheidole biconstricta (Mayr), r. *rubicunda*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 50 (♂ ♀) (1890)⁴.

Pheidole rubicunda, Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 96⁷.

Hab. COSTA RICA⁷ (*Tonduz*) [♂ ♀], Alajuela (*Alfaro*⁶).

3. *Pheidole gouldi*.

Pheidole gouldi, Forel, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. xxx. p. xlii (♂ ♀ ♂) (1886)¹; Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. pp. 588, 599²; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 91³.

Hab. MEXIQUE, Temax en Yucatan (*Gaumer*); GUATÉMALA³, Antigua (*Stoll*¹), environs de la ville de Guatémala (*Champion*).