

4. *Pheidole susannæ*.

Pheidole susannæ, Forel, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. xxx. p. xliii (♂ ♀) (1886)¹; Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. pp. 589, 604²; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 97³.

Hab. GUATÉMALA³, Retalhuleu (*Stoll*¹).

Race *obscurior*.

Pheidole susannæ, r. *obscurior*, Forel, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. xxx. p. xliv (♂ ♀) (1886)⁴; Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 410 (♀ ♂)⁵.

Pheidole susannæ, Forel, var. *obscurior*, Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 97⁶.

Hab. GUATÉMALA, Capetillo (*Champion*) [♀]; COSTA RICA, Alajuela (*Alfaro*).—COLOMBIE (*Forel*); BRÉSIL⁴; ANTILLES, St. Vincent⁵.

Cette race est fort constante et ne doit pas être considérée comme simple variété, ainsi que l'ont fait MM. Mayr et Emery. Elle vit dans les troncs d'arbres pourris où je l'ai observée moi-même en Colombie. Il semble que la *P. obscurior* est la forme généralement répandue dans l'Amérique du sud et que la *P. susannæ*, i. sp., est une race spécialement guatémaliennne.

[5. *Pheidole longipes*.

Pheidole susannæ, Forel, race *longipes*, Pergande, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) v. p. 885 (♂ ♀) (1895)¹.

Hab. BASSE CALIFORNIE, Sierra de San Lazaro, région du Cap (*Eisen et Vasil*¹).

Cette singulière espèce est complètement différente de la *P. susannæ*. Les antennes et les pattes sont démesurément longues et grêles chez le ♂ et la ♀. Chez le ♂ elles dépassent de beaucoup l'occiput et les funicules ont les articles 2 à 9 plus de trois fois plus longs que larges.]

6. *Pheidole vasliti*.

Pheidole vasliti, Pergande, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) v. p. 883 (♂ ♀) (1895)¹.

Hab. BASSE CALIFORNIE, Sierra de San Lazaro (*Eisen et Vasil*¹).

Cette espèce est assez voisine de la *P. fallax*, Mayr, dont elle diffère surtout par ses antennes plus longues et plus grêles, lentement courbées vers leur base.

Var. *hirtula*, n.

♂. Long. 4.5 à 5 millim. D'un brun de poix foncé, avec les pattes et les antennes d'un brun rougeâtre. Abondamment hérissée (corps et membres) de poils dressés, pointus, pas très longs, d'un brun roussâtre. Les scapes atteignent presque les angles occipitaux. Les articles 2 à 8 du funicule sont presque deux fois plus longs que larges. Un peu plus robuste et plus large que la forme typique, dont elle diffère surtout par sa taille, sa couleur et sa pilosité plus abondante. Mésonotum avec une forte impression transversale et un bourrelet derrière.

♀. Long. 2.8 à 3 millim. Couleur brun foncé du ♂ (la forme typique est jaunâtre, avec l'abdomen brun). Tête lisse et luisante derrière, ainsi que le pronotum et le pédicule. Le reste du thorax plus ou moins réticulé et subopaque. Chez la forme typique la tête, le thorax et le pédicule sont réticulés-punctués. Pilosité plus abondante. Du reste comme la forme typique.

BIOL. CENTR.-AMER., Hymenopt., Vol. III., August 1899.

KK