

Hab. MEXIQUE, Durango (*Brinkmann, coll. Forel*).

À première vue, j'ai cru avoir la *P. hirsuta*, Emery, mais les antennes, le 2^{me} article du pédicule sans conules etc., la différencient foncièrement et la rattachent à la *P. vasliti*.

7. *Pheidole columbica*.

Pheidole fallax, r. *columbica*, Forel, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. xxx. p. xlv (24 ♀) (1886) ¹.

Hab. PANAMA, Colon (*Janson*) [24].—COLOMBIE ¹.

L'étude très considérable que j'ai pu faire de cette espèce en Colombie, où elle est extrêmement commune, et au Venezuela, ainsi que sa comparaison avec la var. *jelskii* de la *P. fallax*, Mayr, qui n'est guère moins commune aux Antilles, m'a montré qu'il s'agit de deux espèces différentes, quoique voisines, vivant toutes deux dans la terre. Chose curieuse, c'est la *P. columbica* qu'on trouve à la Jamaïque et la *P. fallax* à la Trinidad. Le scape de la *P. columbica* est beaucoup plus court, et sa tête a une autre forme. On en trouve en Colombie une variété claire, rouge, et une foncée. C'est la première qui a été prise à Colon. Le variété claire est rougeâtre avec la moitié postérieure de l'abdomen seule brunâtre (var. *rubens*, n. var.) ; la variété foncée (celle que j'avais décrite) est noire avec la tête d'un rouge jaunâtre et le thorax brunâtre, plus foncé (noirâtre) derrière, avec le pronotum toujours plus clair, parfois rougeâtre. On observe ces deux variétés à côté l'une de l'autre en Colombie, mais toujours en fourmilières différentes. On les prend d'abord pour des espèces différentes à cause de la couleur. Mais les mœurs, l'habitus et tout le reste est identique.

8. *Pheidole decepatrix*, sp. n. (Tab. III. fig. 20, 24.)

24. Long. 4 à 4.2 millim. Mandibules lisses, luisantes, ponctuées, avec 2 ou 3 grosses rides à la base. Épistome entier à son bord antérieur, avec une petite élévation ou ombilic au milieu. Les scapes dépassent à peine la moitié de la distance de l'origine des antennes aux angles occipitaux. Ils sont courbés à la base, sans épaississement ni coude, logés sur une surface seulement réticulée-ponctuée (sans rides), mais nullement enfoncée. Articles moyens du funicule environ aussi larges que longs. Arêtes frontales courtes, divergentes, ordinaires. Tête plutôt plus longue que large, ayant exactement la forme de celle de la *P. columbica*, mais le sillon frontal se perd devant et les angles occipitaux sont un peu plus étroits. Le pronotum arrondi n'a que des tubercules très mousses, plus mousses encore que chez la *P. columbica*. Le mésonotum n'a qu'une légère et étroite impression transversale suivie d'un très faible bourrelet transversal situé fort en avant et ne formant guère qu'une marche d'escalier éloignée de la suture méso-métanotale, qui est profonde. Face basale du métanotum assez convexe, un peu plus longue que large. Épines longues comme les $\frac{2}{3}$ de l'intervalle des bases, dirigées en haut et un peu en arrière et en dehors. Premier nœud étroit, élevé, squamiforme ; second nœud un peu plus large que long, formant de côté deux cônes courts, mais bien anguleux, situés à son tiers antérieur.
- L'tête subopaque, plutôt mate, finement réticulée-ponctuée partout, sauf l'épistome et l'aire frontale qui sont lisses et luisants au milieu, avec des rides sur les côtés. En outre la tête a devant des rides peu serrées et derrière de gros points en partie réticulaires avec des fragments de ridès—à peu près comme la *P. columbica*. Thorax presque mat, finement réticulé-ponctué, avec quelques grosses rides transversales devant. Pédicule, abdomen et pattes lisses et luisants.