

Pilosité dressée assez abondante, longue, fine, pointue, d'un jaune brunâtre, répandue sur tout le corps et tous les membres.

Entièrement d'un brun jaunâtre sale; abdomen et devant de la tête brunâtres.

*Hab.* GUATÉMALA, Purula in Vera Paz (*Champion*).

C'est à corps défendant que je décris cette espèce au milieu du dédale de ses voisines. Mais ce n'est ni la *P. vasliti*, ni la *P. columbica*, ni la *P. hirsuta*, ni aucune des formes voisines. Plus petite que la *P. columbica*, une de ses plus proches voisines, elle en diffère trop par ses scapes et son mésonotum pour pouvoir être une simple race. La *P. hirsuta*, Emery, est bien plus grande, a le métanotum ridé (chez la nôtre seulement réticulé) et canaliculé, de gros points sur l'abdomen et paraît être bien plus poilue.

### 9. *Pheidole radoszkowskii*.

*Pheidole radoszkowskii*, Mayr, Horæ Soc. Ent. Ross. xviii. p. 35 (♂ ♀) (1884) <sup>1</sup>.

*Hab.* MEXIQUE, Cuernavaca en Morelos (*H. H. Smith*) [♂]; GUATÉMALA (*Stoll*); NICARAGUA, Chontales (*Janson*) [♀]; COSTA RICA (*Tonduz*).—COLOMBIE; GUYANE <sup>1</sup>; BRÉSIL <sup>1</sup>.

Abondante en Colombie, où elle vit surtout au pied des arbres, dans les lieux humides.

Race *pugnax*.

*Pheidole radoszkowskii* (Mayr), r. *militaris*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 49 (♀ ♂) (1890) <sup>2</sup>.

*Pheidole radoszkowskii* (Mayr), st. *pugnax*, Dalla Torre, Wien. ent. Zeit. 1892, p. 91 <sup>3</sup>.

*Pheidole pugnax*, Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 95 <sup>4</sup>.

*Hab.* COSTA RICA <sup>4</sup>, Alajuela (*Alfaro* <sup>2</sup>).

Ce n'est pas une espèce, mais une race assez caractérisée.

### 10. *Pheidole delecta*, sp. n.

Parente de la race *pugnax* et surtout de la race *lallemandi* de la *P. radoszkowskii*, mais encore plus grande.

♀. Long. 6 millim. Comme la *P. radoszkowskii*, r. *lallemandi*, mais la tête est un peu plus allongée et moins fortement échancrée. Thorax plus large, avec les tubercules du pronotum plus larges et plus obtus. Suture pro-mésonotale faiblement imprimée. Le mésonotum a au milieu une impression transversale bien moins grande et moins profonde, formant une gouttière transversale rectiligne très distincte; derrière cette gouttière, le mésonotum est bien moins fortement relevé, faiblement convexe. L'échancrure méso-métanotale est aussi bien moins profonde, aussi faible que la précédente. La face basale du métanotum large, longue et assez plane, ne forme ni gouttière médiane, ni arêtes. Épines du métanotum obtuses et très écartées, divergentes, plus longues que chez la *P. lallemandi*, moins longues que l'intervalle de leurs bases. Nœuds du pédicule un peu plus larges que chez la *P. lallemandi*, mais le 2<sup>me</sup> nœud ne forme pas des conules aussi nets que chez la *P. pugnax*. Les scapes atteignent à peu près le bord occipital; les articles des funicules sont cylindriques, bien plus longs que chez la *P. lallemandi*.

Sculpture comme chez la *P. lallemandi* etc., mais les réticulations grossières s'étendent jusqu'au quart postérieur de la tête. Thorax, pédicule et abdomen densément réticulés-ponctués et mats; cette sculpture est plus forte et plus grossière que chez les *P. lallemandi* et *P. pugnax*. Tout le corps, les pattes et les antennes recouverts d'une pilosité dressée courte, roussâtre et abondante.

Abdomen noirâtre; thorax et pédicule d'un brun foncé; pattes et antennes brunes; tête d'un roux ferrugineux.

*Hab.* MEXIQUE, Michoacan.