

Reçue par M. le Prof. Emery. Diffère surtout des formes *lallemandi* et *pugnax* par ses antennes, son thorax et sa pilosité. Il ne me semble pas impossible qu'on ne découvre des formes intermédiaires.

11. *Pheidole plebecula*, sp. n.

Voisine des plus petites variétés de la *P. radoszkowskii* (*acuta*, Em.).

♂. Long. 3.7 à 3.8 millim. Tête un peu moins échancrée, à côtés un peu moins convexes que chez la *P. acuta*. Épistome imprimé derrière le bord antérieur avec un fragment de carène au milieu. Les scapes atteignent presque le bord occipital; les articles des funicules sont plus allongés et plus cylindriques que chez la *P. acuta*. Thorax comme chez la *P. acuta*; mais la suture pro-mésotale est plus faiblement imprimée. Par contre l'échancrure du mésotum, son élévation postérieure et l'échancrure méso-métanotale sont plutôt plus fortes que chez la *P. acuta*. La face basale du métanotum est plus large, presque plane, sans gouttière ni arêtes. Épines comme chez la *P. acuta*, mais plus inclinées en arrière.

Assez luisante, finement et faiblement réticulée, sauf le métanotum et le pédicule, qui sont plus fortement réticulés et assez mats. Des rides et réticulations grossières sur les joues et sur la partie de la tête située entre les yeux et les arêtes frontales. Quelques longs poils épars sur le corps, le devant de la tête, les scapes et les tibias. Pubescence très éparse.

D'un brun roussâtre ou jaunâtre sale. Moitié postérieure de l'abdomen d'un brun foncé. Tête, pattes et mandibules plus fauves, plus claires.

Hab. COSTA RICA, Alajuela (*Alfaro*).

Reçue par M. le Prof. Emery. Diffère surtout de la *P. radoszkowskii*, r. *acuta*, par la forme de ses antennes, son métanotum et sa pilosité.

12. *Pheidole ursus*.

Pheidole ursus, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xx. pp. 982, 986 (♂) (1870)¹; xxxvii. pp. 587, 598 (♀)²; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 97³.

Hab. MEXIQUE³ (*Bilimek*¹).

13. *Pheidole striaticeps*.

Pheidole striaticeps, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xx. pp. 981, 983, 987 (♂ ♀) (1870)¹; xxxvii. pp. 586, 601²; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 96³.

Hab. MEXIQUE³ (*Norton*¹).

14. *Pheidole picea*.

Pheidole picea, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xx. pp. 981, 983, 988 (♂ ♀) (1870)¹; ibid. xxxvii. pp. 588, 601²; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 94³.

Hab. MEXIQUE³ (*Norton*¹).

15. *Pheidole rogeri*.

Pheidole rogeri, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxviii. p. 64 (♀) (1896)¹.

Hab. COSTA RICA, Jiménez (*Alfaro*¹).