

**16. Pheidole exarata.**

*Pheidole exarata*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxviii. p. 68 (♂) (1896)<sup>1</sup>.

*Hab.* COSTA RICA, San José (*Alfaro*<sup>1</sup>).

**17. Pheidole alfaroi.**

*Pheidole alfaroi*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxviii. p. 70 (♂ ♀ ♂) (1896)<sup>1</sup>.

*Hab.* COSTA RICA (*Pittier*), La Palma 1500 mètres, dans des troncs d'arbres (*Alfaro*<sup>1</sup>).

**18. Pheidole pubiventris.**

*Pheidole pubiventris*, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. pp. 595, 604, 607 (♂ ♀) (1887)<sup>1</sup>.

*Hab.* BRÉSIL<sup>1</sup>.

Race *variegata*.

*Pheidole pubiventris*, Mayr, subsp. *variegata*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxviii. p. 72 (♂ ♀) (1896)<sup>2</sup>.

*Hab.* COSTA RICA, San José (*Alfaro*<sup>2</sup>).

**19. Pheidole scrobifera.**

*Pheidole scrobifera*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxviii. p. 73, figg. 14 a, b (♂ ♀ ♂) (1896)<sup>1</sup>.

*Hab.* COSTA RICA, Jiménez (*Alfaro*<sup>1</sup>).

**20. Pheidole opaca.**

*Pheidole opaca*, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xii. p. 749 (♂ ♂) (1862)<sup>1</sup>.

♀. Long. 10 millim. Ailes enfumées de noirâtre. Tête et mésonotum finement striés en long. Entièrement opaque. Du reste comme le ♂.

*Hab.* MEXIQUE, Atoyac en Vera Cruz (*Schumann*) [♂]; GUATÉMALA, Purula, Sinanja, et Panima en Vera Paz, Las Mercedes (*Champion*) [♂ ♀]; COSTA RICA, Tuis (*Pittier*) [♂ ♀]; PANAMA, Bugaba, Volcan de Chiriqui (*Champion*).—BRÉSIL<sup>1</sup>.

**21. Pheidole tepicana.**

*Pheidole tepicana*, Pergande, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) v. p. 878 (♂) (1895)<sup>1</sup>.

*Hab.* MEXICO, Tepic (*Eisen et Vasil*<sup>1</sup>).

**22. Pheidole rugifrons.**

*Pheidole rugifrons*, Pergande, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) v. p. 880 (♂) (1895)<sup>1</sup>.

*Hab.* MEXICO, Tepic (*Eisen et Vasil*<sup>1</sup>).

**23. Pheidole subdentata.**

*Pheidole subdentata*, Pergande, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) v. p. 888 (♂) (1895)<sup>1</sup>.

*Hab.* MEXICO, Tepic (*Eisen et Vasil*<sup>1</sup>).