

24. **Pheidole obtusospinosa.**

Pheidole obtusospinosa, Pergande, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) v. p. 889 (4) (1895)¹.

Hab. MEXICO, Tepic (*Eisen et Vaslit*¹), Durango (*Brinkmann, en coll. Forel*).

25. **Pheidole townsendi.**

Pheidole townsendi, André, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 246 (4 ♀)¹.

Hab. MEXIQUE (*Townsend*¹).

26. **Pheidole fimbriata.** (Tab. III. fig. 21, 4.)

Pheidole fimbriata, Roger, Berl. ent. Zeitschr. 1863, p. 196 (4 ♀)¹; Mayr, Verh. zool.-bot. Ges.

Wien, xx. p. 981²; ibid. xxxvii. pp. 586, 598³; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 90⁴.

Hab. GUATÉMALA, Chacoj en Vera Paz (*Champion*) [♂ 4]; COSTA RICA⁴.—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, Brésil⁴, Paraguay^{1 2 4}.

27. **Pheidole bilimeki.**

Pheidole bilimeki, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xx. pp. 980, 985 (4 ♀ ♀) (1870)¹; xxxvii. p. 584²; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 88³.

Hab. MEXIQUE³ (*Bilimek*¹).

28. **Pheidole maja.**

Pheidole maja, Forel, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. xxx. p. xlvi (4 ♀ ♀) (1886)¹; Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. pp. 594, 604²; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 92³.

Hab. GUATÉMALA³, Ville de Guatémala et Tecpam 7000' (*Stoll*¹).

29. **Pheidole inermis.**

Pheidole inermis, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xx. pp. 979, 982, 984 (4 ♀) (1870)¹; ibid. xxxvii. pp. 587, 598²; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 91³.

Hab. MEXIQUE³ (*Norton*¹).

30. **Pheidole fiorii.**

Pheidole fiorii, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 51 (4) (1890)¹; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 90².

♀. Long. 6.5 millim. Brune. Trois taches sur le mésonotum, deux taches sur les côtés du thorax, parfois de petites taches à la base de l'abdomen, pattes et antennes jaunâtres. La tête souvent rougeâtre avec le vertex brun. Opaque. Parfois en partie subopaque. Ailes jaunâtres, nervures pâles. Thorax assez large, arrondi.

Hab. GUATÉMALA, Cubilguitz en Vera Paz (*Champion*); COSTA RICA² (*Tonduz*), Jiménez (*Alfaro*¹), Tuis (*Pittier*); PANAMA, Bugaba (*Champion*).