

32. *Pheidole anastasii*.

Pheidole anastasii, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxviii. p. 76 (♂ ♀) (1896)¹.

Hab. COSTA RICA, Jiménez (*Alfaro*¹).

33. *Pheidole punctatissima*.

Pheidole punctatissima, Mayr, Sitzungsab. Akad. Wiss. Wien, lxi. p. 400 (♂ ♀ ♂) (1870)¹; Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xx. pp. 980, 983²; ibid. xxxvii. pp. 583, 598³; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 51⁴; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 95⁵.

Hab. MEXIQUE^{2 5}; GUATÉMALA, environs de la ville (*Champion*); COSTA RICA (*Tonduz*), Alajuela, San José, Jiménez (*Alfaro*⁴), Buenos Aires (*Pittier*); PANAMA, Volcan de Chiriqui (*Champion*).—COLOMBIE^{2 4}.

Très commune en Colombie, fait son nid dans la terre, souvent le long des murs des maisons.

34. *Pheidole subarmata*.

Pheidole subarmata, Mayr, Horæ Ent. Ross. xviii. p. 36 (♂ ♀) (1884)¹; Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. pp. 595, 606²; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 51, t. 5. figg. 12, 13³; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 97⁴.

Hab. MEXIQUE, Atoyac en Vera Cruz (*H. H. Smith*); COSTA RICA⁴, Alajuela, San José (*Alfaro*³).—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, Cayenne⁴.

Var. *elongatula*.

Pheidole subarmata, var. *elongatula*, Forel, Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 408 (♂ ♀ ♂)⁵.

Hab. MEXIQUE, Teapa en Tabasco (*H. H. Smith*).—COLOMBIE; ANTILLES, St. Vincent⁵.

J'ai observé cette espèce et la variété *elongatula* en Colombie et aux Antilles, où elle est fort commune. Elle est très souterraine, et mine ses nids, qui sont petits, dans la terre. On la trouve dans la forêt et dans les jardins des villes.

35. *Pheidole hirsuta*.

Pheidole hirsuta, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxviii. p. 65 (♂) (1896)¹.

Hab. COSTA RICA, Jiménez (*Alfaro*¹).

Cette espèce paraît être très voisine de la *P. vasliti*, Pergande, dont elle diffère surtout par ses antennes plus courtes et moins grêles. Chez la *P. vasliti*, les articles moyens des funicules sont bien plus longs que larges.

36. *Pheidole championi*, sp. n. (Tab. III. fig. 22, 24.)

24. Long. 4.7 millim. Mandibules lisses, luisantes, ponctuées, fortes, épaisses. Tête presque carrée, très grande, longue comme le thorax et le pédicule réunis, un peu plus longue que large, à côtés très peu convexes, à peine plus large derrière que devant, profondément incisée derrière, l'incisure se continuant par le sillon frontal sans interruption. Lobes occipitaux plutôt étroits. Les scapes sont très courts,