

grêles, et atteignent la moitié de la distance de l'articulation de l'antenne à l'angle occipital. Les articles 2 à 8 des funicules sont au moins aussi larges que longs. Épistome déprimé, à peine convexe, sans trace de carène, entier et à peine imprimé au milieu de son bord antérieur. Aire frontale arrondie derrière.

Yeux petits, situés au quart antérieur des côtés de la tête. Arêtes frontales longues, inclinées en dehors vers l'horizontale, bien plus encore que chez la *P. germaini*, divergentes, fort écartées, aussi écartées derrière que du bord de la tête. La tête a de chaque côté une très large impression oblique en dehors du front et du vertex. Le pronotum a en haut deux forts tubercules saillants, mais très arrondis, bien moins proéminents que chez la *P. germaini*; entre les deux tubercules il est convexe. Le mésonotum n'a qu'une faible impression transversale et un faible bourrelet derrière. Face basale du métanotum subbordée ou bordée, avec une gouttière longitudinale. Épines grêles, médiocrement divergentes, plus courtes que l'intervalle de leurs bases. Premier nœud étroit, squamiforme. Second nœud trois fois plus large que le premier, plus large que long, avec deux conules latéraux situés au milieu et distinctement recourbés en arrière. Pattes assez courtes et épaisses.

Épistome luisant, faiblement réticulé; joues subopaques, densément réticulées, avec des rides longitudinales. Tout le reste du corps et les membres fort luisants, avec des points épars piligères. Quelques rides faibles, longitudinales sur le front, transversales sur le thorax, surtout sur le métanotum, où elles sont fines. Quelques gros points sur le 2^{me} nœud.

Quelques poils dressés assez longs et adjacents, très courts, roussâtres, épars sur tout le corps, les tibias et les scapes. D'un rouge brunâtre foncé; devant de la tête, scapes et abdomen bruns. Funicules et pattes d'un jaune brunâtre.

♀. Long. 7 millim. Épistome, arêtes frontales etc. comme chez le ♂. Les scapes atteignent le $\frac{1}{4}$ postérieur de la tête. Front très faiblement et finement strié au milieu. Côtés de la tête et derrière de l'occiput lisses et luisants. Vertex presque lisse. Les stries du devant de la tête et de l'occiput assez fines et peu fortes. Milieu de l'épistome lisse et luisant. Mésonotum plus étroit que la tête, finement et faiblement strié (stries effacées). Métanotum presque lisse en dessus, avec deux épines très obtuses à l'extrémité et de longueur médiocre. Second nœud du pédicule deux fois plus large que long, avec de forts cônes latéraux.

D'un brun de poix. Pattes et antennes d'un brun jaunâtre. Ailes brunes.

Hab. PANAMA, Volcan de Chiriqui (*Champion*).

Voisine de la *P. crassipes*, Mayr, r. *germaini*, Emery.

37. *Pheidole rhinoceros*, sp. n. (Tab. III. figg. 23, 23 a, 24.)

♂. Long. 4.2 millim. Premier aspect voisin de la *P. megacephala*, dont elle a le thorax et le pédicule, mais très différente en réalité. Tête bien plus petite en proportion du corps que chez la *P. championi*, mais de même forme ainsi que les antennes, dont les scapes sont aussi courts que la moitié de la distance de la racine des antennes à l'angle occipital. Mandibules très lisses, presque sans points. Épistome sans échancrure, peu convexe, mais portant au milieu, en place de carène, une dent pointue, proéminente et comprimée, à peu près triangulaire. Les arêtes frontales sont courtes, relevées devant, où elles sont fort saillantes, presque triangulaires. Le sillon frontal est très faible, presque obsolète devant le vertex. Yeux situés aux $\frac{2}{5}$ antérieurs des côtés de la tête. Pas le loge pour les scapes, pas de dépression latérale sensible sur la tête.

Pronotum arrondi comme chez la *P. megacephala*. Le mésonotum a une apparence d'impression transversale. Face basale du métanotum plutôt convexe. Épines très courtes, subverticales; ce ne sont guère que deux dents. Second nœud un peu plus large que long, arrondi, sans dent dessous.

Sculpture, pilosité et couleur comme chez les exemplaires foncés de la *P. megacephala*, mais les rides du devant de la tête sont plus fines et plus serrées.

♀. Long. 2.4 à 2.5 millim. Épistome distinctement caréné, mais sans dent. Les scapes dépassent à peine l'occiput. La tête, plus carrée que chez la *P. megacephala*, a un bord postérieur distinct. Le métanotum a deux dents encore visibles. D'un brun de poix, avec les mandibules, les pattes, les antennes et le pédicule d'un jaunâtre sale ou brunâtre. Du reste comme la *P. megacephala*.

Hab. PANAMA, Bugaba (*Champion*).