

Myrmica (?) *laevigata*, Smith, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) iii. p. 130 (1855) ⁴.

Pheidole janus, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 175 ⁹.

Hab. MEXIQUE, Teapa en Tabasco (*H. H. Smith*), Temax en Yucatan (*Gaumer*) [♂];
HONDURAS, Ile de Ruatan (*Gaumer*).—ZONA TORRIDA ORBIS TERRARUM.

43. *Pheidole dimidiata*.

Pheidole dimidiata, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxvi. p. 160 ¹.

Hab. BOLIVIA ¹.

Var. *nitidicollis*.

Pheidole dimidiata, var. *nitidicollis*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxviii. p. 79 (♂ ♀) (1896) ².

Hab. COSTA RICA, Jiménez (*Alfaro* ²).

44. *Pheidole floridana*.

Pheidole flavens, subsp. *floridana*, Emery, Zool. Jahrb. viii. p. 293 (1894) ¹.

Hab. AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE, Florida ¹.

Var. *deplanata*.

Pheidole floridana, Emery, var. *deplanata*, Pergande, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) v. p. 883 (♂ ♀) (1895) ².

Hab. MEXIQUE, Tepic (*Eisen et Vasil* ²).

45. *Pheidole flavens*.

Pheidole flavens, Roger, Berl. ent. Zeitschr. vii. p. 198 (♂ ♀) (1863) ¹.

Hab. COSTA RICA (*Tonduz*).—ANTILLES, Cuba ¹.

Var. *breviscapa*, n.

♂. Diffère de la *P. flavens*, var. *sculptior*, Forel, à laquelle elle ressemble par sa sculpture aussi forte et sa tête entièrement mate, en ce que ses scapes sont encore plus courts, n'atteignant que la moitié de la distance de l'origine des antennes à l'angle occipital. Le mésonotum est arrondi, sans trace d'impression transversale (distincte chez la *P. sculptior*). Enfin les épines ou dents métanotales sont plus larges, un peu plus courtes et presque horizontales, dirigées en arrière.

Hab. GUATÉMALA, Retalhuleu (*Stoll*).

Sous-gen. CERATOPHEIDOLE, Pergande.

Pheidole, subgen. *Ceratopheidole*, Pergande, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) v. p. 889 (♂ ? ♀ ?) (1895).

46. *Pheidole* (*Ceratopheidole*) *granulata*.

Pheidole (*Ceratopheidole*) *granulata*, Pergande, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) v. p. 890 (♂ ?) (1895) ¹.

Hab. MEXIQUE, Tepic (*Eisen et Vasil* ¹).

Il est impossible de juger de la valeur du sous-genre *Ceratopheidole* sur la simple