

Hab. AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE, Les États Unis du Sud.—MEXIQUE, Durango (*Brinkmann, coll. Forel*); COSTA RICA (*Alfaro*³); PANAMA (*Stretch*^{1 2}).—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, jusqu'à l'Argentine; ANTILLES.—ZONA TORRIDA ORBIS TERRARUM⁴, excl. Afrique.

Cette fourmi est l'espèce la plus commune de l'Amérique tropicale, où elle ne fait pas défaut, je crois, sur un seul kilomètre carré des terres basses, de la Virginie au sud de la République Argentine. Je renonce donc à indiquer les diverses localités où elle a été prise, car cela n'a pas de sens. Je l'ai trouvée moi-même à chaque pas, sur chaque hectare de terrain en Colombie et aux Antilles. Elle pique fort, est très agressive, et fait, dans la terre des forêts, des savannes, des jardins, des nids à dômes maçonnés.

La forme américaine est noire ou brunâtre, avec la tête des ♂ maxima rougeâtre. C'est celle que Fabricius a décrite. La forme de l'Asie tropicale (*S. geminata*, F., r. *rufa*, Jerdon) est une race différente qui a entre la mésosternum et le prosternum, de chaque côté, une dent dirigée en bas et en dehors. Le 1^{er} nœud du pédicule est aussi plus épais, et la couleur est toujours d'un jaune rouge ou orange, avec la moitié postérieure de l'abdomen seule brune. C'est cette race *rufa* qui seule est cosmopolite et qui a aussi été transportée aux Antilles (et au Mexique, Durango, *Brinkmann, etc.*), tandis que la vraie *geminata* (foncée) est confinée à l'Amérique tropicale.

2. *Solenopsis succinea*.

Solenopsis succinea, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 52 (♂ ♀ ♂) (1890)¹; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 77².

Hab. COSTA RICA², Jiménez (*Alfaro*¹).

3. *Solenopsis picea*.

Solenopsis picea, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxviii. p. 89 (♂ ♀) (1896)¹.

Hab. COSTA RICA (*Pittier, Tonduz*), Jiménez (*Alfaro*¹).

4. *Solenopsis corticalis*.

Solenopsis corticalis, Forel, Mittheil. München. ent. Ver. v. p. 13 (♀ ♂) (1881)¹.

Hab. COSTA RICA (*Tonduz*).—ANTILLES, St. Thomas¹.

5. *Solenopsis picquarti*, sp. n.

Long. 1.6 à 1.7 millim. Tête assez grosse, distinctement échancrée derrière, plus large derrière que devant, à côtés faiblement convexes, assez déprimée. Mandibules lisses, luisantes. Yeux grands, ayant 7 à 8 facettes en une lignée dans leur plus grand diamètre, situés légèrement en avant du tiers antérieur de la tête. Épistome avec un lobe médian antérieur échancré au milieu de son bord antérieur, fort avancé, et terminé par deux dents courtes, larges, dirigées en dehors et légèrement courbées en dehors. L'épistome est déprimé, peu convexe; les deux carènes y sont presque obsolètes et les dents ne forment guère que les angles latéraux du lobe médian. De chaque côté de ce lobe, l'épistome est fortement échancré et a un