

19. *Cremastogaster opaca*.

Cremastogaster opaca, Mayr, Verh. zool-bot. Ges. Wien, xx. pp. 989, 992 (♀) (1870)¹; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 84².

Hab. MEXIQUE² (*Bilimek et Sichel*¹).

20. *Cremastogaster saussurei*, sp. n.

♀. Long. 4.2 à 4.4 millim. Entièrement d'un brun à peine rougeâtre. Abdomen d'un brun noirâtre. Premier article du pédicule presque deux fois plus large que long (sans les articulations). Tête et thorax finement et assez densément réticulés ou réticulés-ponctués, subopaques ou mats. Thorax très peu ou pas ridé. Du reste absolument identique à la *C. scutellaris*, Oliv., d'Europe.

Hab. MEXIQUE, Moyoapam (*coll. Saussure*).

Ressemble à une grosse *C. scutellaris*, race *auberti*, sauf l'éclat. N'a pas la massue jaune ni le 1^{er} article du pétiole déprimé devant de la *C. sanguinea*. N'a pas le pronotum bordé, ni le thorax rugueux comme dans la *C. opaca*. Voisine de *C. lineolata*, Say.

7^{me} Tribu PSEUDOMYRMII.

PSEUDOMYRMA.

Pseudomyrma, Lund, Ann. Sci. Nat. xxiii. p. 137 (1831); Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 55.

♀. *Tetraponera*, Smith, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) ix. p. 44 (1852).

♀. *Condylodon*, Lund, Ann. Sci. Nat. xxiii. p. 131 (1831) (sine descr.).

♀. *Leptalea*, Erichson, Arch. f. Naturg. v. p. 309 (1839).

♀. *Myrmex*, Guérin, Icon. Règne Anim., Ins. p. 422 (1845).

1. *Pseudomyrma filiformis*.

Formica filiformis, Fabr. Syst. Piez. p. 405 (♀) (1804)¹; Roger, Berl. ent. Zeitschr. 1862, p. 289².

Leptalea filiformis, Erichs. Arch. f. Naturg. v. p. 309³.

Pseudomyrma filiformis, Mayr, Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, lxi. p. 407⁴; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 56⁵.

Pseudomyrma cephalica, Smith, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) iii. p. 168 (♀ ♀ ♂), t. 13. figg. 12-17 (1855)⁶; ibid. (3) i. p. 32⁷; Cat. Hymen. vi. p. 155, t. 10. figg. 25, 26⁸.

Hab. PANAMA (*Stretch*⁷), Bugaba et Caldera (*Champion*) [♀].—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, Brésil^{1-6 8}.

Nid trouvé dans une tige creuse par Bates.

2. *Pseudomyrma perbosci*.

Pseudomyrma (Myrmex) perbosci, Guér. Icon. Règne Anim., Ins. p. 428 (♀) (1845)¹.

Pseudomyrma perbosci, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 156²; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 58³.

♀. Long. 7 millim. Tête 1½ fois plus longue que large. Mandibules lisses et luisantes. Les scapes atteignent le milieu de la longueur de la tête, qui est rectangulaire et a trois ocelles très distincts. Pronotum subdéprimé, subrectangulaire, assez nettement bordé. Mésonotum presque aussi long que large.