

Échancrure méso-mésotale très distincte, courte, profonde, en gouttière transversale. Face basale du métanotum subdéprimée et subbordée, bien plus longue que large. Premier nœud du pédicule subbordé en haut, élargi derrière, pétiolé devant. Second nœud large, fort élargi au milieu, beaucoup plus rétréci devant que derrière. Cuisses fort renflées.

Lisse et luisante, à peine çà et là un peu chagrinée ou ponctuée. Pilosité presque nulle; pubescence espacée et fine, plus abondante sur l'abdomen.

D'un jaune roussâtre ou rougeâtre. Abdomen et milieu des cuisses bruns.

Correspond assez bien à la description que Guérin a fait de la ♀.

*Hab.* MEXIQUE, Baie de Campeche<sup>2 3</sup> (*Perbosc*<sup>1</sup>); COSTA RICA (*Alfaro*).

Reçue de Costa Rica par M. le Prof. Emery.

### 3. *Pseudomyrma thoracica*.

*Pseudomyrma thoracica*, Norton, Amer. Nat. ii. p. 66 (1868)<sup>1</sup>; Proc. Essex Institute, vi., Comm. p. 8 (♂)<sup>2</sup>; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 59<sup>3</sup>.

*Hab.* MEXIQUE<sup>1-3</sup>.

### 4. *Pseudomyrma belti*.

*Pseudomyrma belti*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. pp. 46, 63, t. 6. figg. 1, a-f (♂) (1890)<sup>1</sup>; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 56<sup>2</sup>.

*Hab.* MEXIQUE (*coll. Forel*), Orizaba (*coll. Saussure*); GUATÉMALA, Ville de Guatémala (*Champion*); NICARAGUA, Chontales (*Belt*); COSTA RICA<sup>2</sup>, Alajuela, Jiménez, Liberia (*Alfaro*<sup>1</sup>).

Cette espèce vit dans les épines d'acacias. Voir Tab. II. fig. 9.

Race *fulvescens*.

*Pseudomyrma belti*, r. *fulvescens*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 64 (♂)<sup>3</sup>.

*Pseudomyrma fulvescens*, Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 57<sup>4</sup>.

*Hab.* MEXIQUE<sup>3</sup>; GUATÉMALA<sup>4</sup> (*Stoll*<sup>1</sup>).

### 5. *Pseudomyrma dolichopsis*, sp. n.

♂. Long. 4.5 à 5 millim. environ. Étroite et allongée. Mandibules plutôt petites, à bord interne parallèle au bord externe, à bord terminal assez oblique, muni de deux dents distinctes devant et de 3 ou 4 indistinctes derrière. Elles sont luisantes, finement striolées ou chagrinées. Bord antérieur de l'épistome droit, avec un lobe rectangulaire au milieu. Tête rectangulaire, d'un bon tiers plus longue que large, échancrée derrière, à côtés légèrement convexes (un peu rétrécie devant et derrière). Yeux grands, allongés, occupant au milieu la moitié des côtés de la tête, finement et brièvement poilus. Sillon frontal indistinct. Les scapes atteignent la moitié de la longueur de leur origine au bord occipital. Les articles 3 à 9 des funicules sont à peu près aussi longs que larges. Thorax à peu près identique à celui de la *P. belti*, Em., mais le pronotum est moins arrondi, nettement subbordé, un peu plus prismatique. Nœuds du pédicule plus élevés et plus larges que chez la *P. belti*. Premier nœud élevé, un peu plus long que large derrière, avec une surface antérieure-supérieure subbordée fortement convexe et s'élargissant d'avant en arrière, subdéprimée transversalement. Derrière le 1<sup>er</sup> nœud est tronqué verticalement. Second nœud presque deux fois plus large que long, presque aussi large que l'abdomen, subtronqué devant. Abdomen allongé et étroit. Pattes comme chez la *P. belti*.

Mate, finement et densément ponctuée et pubescente, comme la *P. belti*. Une pilosité fine, pointue, inégale, jaunâtre, plutôt courte, abondante partout, aussi sur les tibias et les scapes.