

Hab. GUATÉMALA, Pantaleon (*Champion*); COSTA RICA (*Tonduz*), Alajuela, Liberia (*Alfaro*²).—COLOMBIE (*Lindig*).

Les exemplaires de Costa Rica, de M. Tonduz, ont les nœuds du pédicule et le pronotum largement bordés de jaunâtre sur les côtés.

Var. fortis, n.

♂. Long. 6 millim. Diffère de la forme typique par sa forte taille, sa stature plus robuste et son métanotum plus large, à face basale assez convexe, seulement subbordée et bien plus longue que la face déclive. Le premier article du pédicule a une forte dent dessous. La face basale du métanotum n'est pas non plus rétrécie devant comme chez la *P. sericea* typique.

Hab. MEXIQUE, Atoyac en Vera Cruz (*H. H. Smith*).

11. *Pseudomyrma künckeli*.

Pseudomyrma künckeli, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. pp. 46, 62 (♂ ♀), t. 6. fig. 5 (1890)¹; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 57².

Hab. GUATÉMALA, Torola, Pantaleon (*Champion*); COSTA RICA², Alajuela (*Alfaro*¹).—COLOMBIE.

J'ai observé cette espèce en Colombie, à Dibulla, au pied de la Sierra Nevada de Santa Marta. Son nid se trouvait miné dans une forte branche sèche d'un acacia, et non pas dans les épines. La fourmilière était considérable. Les ♂ m'attaquèrent avec fureur. Leur piqure est fort douloureuse.

12. *Pseudomyrma caroli*, sp. n.

♂. Long. 4.6 à 5.7 millim. Robuste. Mandibules à bord externe presque droit, à bord terminal oblique, grossièrement striées, plus ou moins lisses et luisantes vers la base. Épistome subcaréné, biéchancré, brièvement lobé. Tête faiblement trapézoïdiforme, distinctement échancrée derrière, un peu plus large derrière que devant, à côtés à peine convexes, une fois et un tiers plus longue que large. Les yeux allongés sont sans poils et situés au milieu du côté, dont ils occupent un fort tiers. Les scapes n'atteignent pas la moitié de la distance de leur origine au bord occipital. Funicule court et épais; ses articles 3 à 9 sont environ deux fois plus épais que longs. Sillon frontal indistinct.

Dos du thorax faiblement convexe d'avant en arrière, subdéprimé, à peine subbordé, sauf au pronotum, qui est presque bordé et a les côtés comprimés. Entre le mésonotum et le métanotum, une faible et courte incisure transversale, au fond de laquelle se trouve un bourrelet transversal qui constitue le segment intermédiaire avec un stigmate proéminent de chaque côté. La face basale du métanotum est longue $1\frac{1}{2}$ fois comme la déclive, à laquelle elle passe par une courbe assez brusque. Les nœuds du pédicule ont la forme de ceux de la *P. künckeli*, Em., mais ils sont un peu moins courts et moins larges; le premier est légèrement plus long que large, le second presque deux fois plus large que long, moins en cloche, plus transversal que chez la *P. künckeli*. Pattes courtes; cuisses renflées au milieu, un peu comprimées.

Luisante; ponctuation assez forte, mais espacée, plus serrée sur le front; l'intervalle des points lisse et luisant. Pilosité dressée fine, pointue, jaunâtre, assez abondante partout, pattes et scapes inclusivement. Pubescence d'un gris jaunâtre, espacée sur la tête et le thorax, formant un duvet grisâtre sur le pédicule et l'abdomen, où elle diverge en arrière à partir de la ligne médiane.

D'un brun foncé; antennes, moitié antérieure et côtés de la tête, tarses, extrémités des tibias, des cuisses et des hanches, bords des segments du thorax et du pédicule d'un roux jaunâtre.

♀. Long. 7.5 millim. Tête un peu plus d'une fois et demie plus longue que large, plus fortement échancrée derrière que chez l'ouvrière. Thorax très étroit et très allongé. Premier nœud du pédicule bien plus