

long que large ; le second $1\frac{1}{4}$ fois plus large que long. Ailes hyalines, légèrement poilues, à nervures jaunâtres et tache marginale brune.

Hab. COSTA RICA, Nicoya (*M. R. Alfaro*).

Reçue par M. le Prof. Emery, auquel je la dédie. Rapprochée de la *P. künckeli*, Em., par son pédicule, elle en diffère entièrement par sa tête. Elle paraît surtout parente de la *P. latinoda*, Mayr, mais la tête et les yeux sont beaucoup plus allongés.

13. *Pseudomyrma euryblemma*, sp. n.

♀. Long. 5 millim. Mandibules triangulaires, assez lisses et luisantes, avec quelques stries, à bord terminal assez droit et peu distinctement denté. Bord antérieur de l'épistome fortement biéchancré, brièvement lobé au milieu. Le bord antérieur du lobe est tridenté et dépasse à peine celui des portions latérales de l'épistome, en dehors des échancrures. La tête est rectangulaire, large, au moins aussi large devant que derrière, d'un cinquième plus longue que large, à côtés peu convexes et à bord postérieur faiblement et largement échancré. Les yeux grands et longs, situés un peu en avant des côtés, en occupent une forte moitié. Les scapes n'atteignent pas la moitié de la distance de leur origine au bord occipital. Articles du funicule aussi longs que larges. Reste du corps étroit et allongé. Thorax à peu près comme chez la *P. caroli*, mais le pronotum n'est que subbordé ; ses côtés sont à peine comprimés, et la face basale du métanotum passe par une courbe plus lente à la déclive. Premier nœud du pédicule deux fois plus long que large ; second nœud presque pyriforme, à peine plus large que long. Cuisses un peu renflées et légèrement comprimées.

Médiocrement luisante ; tête plus luisante, plus finement et plus abondamment ponctuée que chez la *P. caroli*. Pilosité presque nulle ; pubescence très fine, jaunâtre, plutôt espacée, formant à peine un léger duvet sur les cuisses et l'abdomen.

D'un roux brunâtre sale ; devant de la tête d'un jaunâtre plutôt pâle. Abdomen et 2^{me} nœud du pédicule bruns.

Hab. COSTA RICA, Alajuela (*Alfaro*).

Reçue par M. le Prof. Emery.

14. *Pseudomyrma excavata*. (Tab. IV. figg. 5, 5 a, ♀.)

Pseudomyrma excavata, Mayr, Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, lxi. pp. 407, 410 (♀) (1870).

Hab. MEXIQUE, Teapa en Tabasco (*H. H. Smith*) ; COSTA RICA (*Tonduz*) ; PANAMA, Bugaba (*Champion*).—COLOMBIE (*Lindig, Forel*).

15. *Pseudomyrma gracilis*.

Formica gracilis, Fabr. Syst. Piez. p. 406 (♀) (1804)¹ ; Roger, Berl. ent. Zeitschr. 1862, p. 289².

Leptalea gracilis, Erichs. Arch. f. Naturg. v. p. 309 (1839)³.

Pseudomyrma gracilis, Mayr, Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, lxi. pp. 407, 408⁴ ; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 59, t. 5. fig. 17⁵ ; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 57⁶.

Pseudomyrma bicolor, Guér. Icon. Règne Anim., Ins. p. 427 (1845)⁷ ; Smith, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) iii. p. 157⁸ ; ibid. (3) i. p. 32⁹ ; Cat. Hymen. vi. p. 153¹⁰ ; Norton, Amer. Nat. ii. p. 65, t. 1. fig. 8 (♀)¹¹ ; Proc. Essex Institute, vi., Comm. p. 8, fig. 12.

Hab. MEXIQUE^{11 12}, Jalisco (*Schumann*), Chilpancingo en Guerrero, Atoyac et Orizaba en Vera Cruz, Teapa en Tabasco (*H. H. Smith*), Temax en Yucatan (*Gaumer*) ; GUATÉMALA, Pantaleon, Ville de Guatémala (*Champion*) ; NICARAGUA, Chontales