

(Janson); PANAMA, Bugaba, Volcan de Chiriqui, Caldera (*Champion*).—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, jusqu'à Brésil<sup>6</sup>.

(Avec la variété *bicolor*, Guérin, qui n'est qu'une variété absolument inconstante de couleur, sans autre importance.)

Cette espèce fait son nid dans les tiges creuses où les ♂ se trouvent l'une après l'autre, ainsi dans les tiges de graminées de la savanne. Très commune sur les arbres de toutes les forêts et les savannes de l'Amérique tropicale, du Mexique au sud du Brésil. La couleur varie du jaune par le rouge au noir avec tous les dessins imaginables.

Var. *mexicana*.

*Pseudomyrma mexicana*, Roger, Berl. ent. Zeitschr. 1863, p. 178 (♂)<sup>13</sup>.

*Pseudomyrma gracilis* (Fabr.), var. *mexicana*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. pp. 45, 60, t. 5. fig. 16 (♂)<sup>14</sup>; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 57<sup>15</sup>.

*Hab.* MEXIQUE<sup>13-15</sup>, Chilpancingo et Tepetlapa in Guerrero (*H. H. Smith*), Cordova (*Sallé*); GUATÉMALA, San Gerónimo, Ville de Guatémala (*Champion*); COSTA RICA (*Tonduz*), Alajuela (*Alfaro*<sup>14</sup>); PANAMA, Bugaba (*Champion*).

Chez cette variété, du moins chez les exemplaires de Chilpancingo, la pilosité est très éparsée.

Var. *major*, n.

Long. 11 millim. Taille de la *P. mutilloides*, Emery, mais la forme est celle de la *P. gracilis*, tant pour le pétiole que pour le pronotum. Les scapes sont fort courts, comme chez la var. *mexicana* (n'atteignent que la moitié de la distance de leur origine au bord occipital), et la tête est un peu plus allongée que chez le type. D'un rouge-jaune. Tête (sauf le bord antérieur) et abdomen noirs.

*Hab.* MEXIQUE, Pinos Altos in Chihuahua (*Buchan-Hepburn*).

Var. *dimidiata*.

*Pseudomyrma dimidiata*, Roger, Berl. ent. Zeitschr. vii. p. 177 (♂) (1863)<sup>16</sup>.

*Pseudomyrma gracilis*, var. *dimidiata*, Mayr, Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, lxi. p. 406 (1870)<sup>17</sup>.

*Hab.* MEXIQUE, Teapa et Frontera en Tabasco (*H. H. Smith*), Temax en Yucatan (*Gaumer*); GUATÉMALA, Las Mercedes (*Champion*).—COLOMBIE<sup>16</sup>.

Les exemplaires des deux dernières localités ne sont pas la *P. dimidiata* pure, car le thorax est jaune et l'extrémité de l'abdomen brune. Mais leur tête noire et la nuance claire du reste les rapproche plutôt de la *P. dimidiata*.

## 16. *Pseudomyrma lævigata*.

*Pseudomyrma lævigata*, Smith, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 62 (♂)<sup>1</sup>.

*Pseudomyrma gracilis*, Fabr., st. *lævigata*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 61 (♂), t. 5. fig. 22 (1890)<sup>2</sup>.

*Hab.* COSTA RICA (*Pittier*, *Tonduz*).—COLOMBIE, Sierra Nevada de Santa Marta (*Forel*); BRÉSIL<sup>1 2</sup>.