

Cette espèce se distingue de la *P. gracilis* non seulement par sa faible sculpture, son éclat, ses poils foncés, son pronotum plus relevé, son 2^{me} segment pétiolaire, plus allongé (plus long que large), mais encore par le lobe antérieur extrêmement court, presque nul, mais plus large, de son épistome. L'exemplaire de Costa Rica a 7.5 millim., celui de Colombie 9.5 millim.

17. *Pseudomyrma nigrocincta*.

Pseudomyrma nigrocincta, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. pp. 46, 64 (♂ ♀), t. 6. fig. 3 (1890)¹;
Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 58².

Hab. COSTA RICA², Alajuela, Jiménez¹.

Vit dans les épines d'acacias.

18. *Pseudomyrma pallida*.

Pseudomyrma pallida, Smith, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) iii. p. 159 (1855)¹.

Hab. AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE, Florida.—MEXIQUE, Tepic (*Eisen et Vasil*).—COLOMBIE, San Antonio, Sierra Nevada de Santa Marta, 1000 mètres (*Forel*); TRINIDAD (*Urich*).

La *P. pallens*, Mayr, pourrait bien être la même espèce, car Smith appelle souvent "smooth" ce qui ne l'est pas.

M. Pergande identifie les types d'Eisen à la *P. pallida*, Smith. Les exemplaires que j'ai récoltés à San Antonio avaient leur nid dans les tiges creuses des graminées de la savanne et correspondent exactement à la description de Smith. Le 1^{er} nœud du pédicule est distinctement bordé (un peu comme chez la *P. elegans*); l'abdomen est plus pâle que la tête, qui est rougeâtre. Le dos du thorax est subbordé, assez déprimé, le pronotum légèrement épaulé. Certains exemplaires ont deux taches brunes plus ou moins confluentes à la base de l'abdomen. Long. 3.8 à 4.2 millim. Du reste très semblable à la *P. flavidula*. Le lobe antérieur de l'épistome est un peu plus avancé et plus étroit. Un exemplaire de Rio Grande do Sul, reçu dans le temps de M. Emery comme *P. flavidula*, se rapporte à cette espèce, quoique étant un peu moins luisant que les autres.

19. *Pseudomyrma flavidula*.

Pseudomyrma flavidula, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 157 (♂) (1858)¹; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) i. p. 32²; Norton, Amer. Nat. ii. p. 65 (1868)³; Mayr, Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, lxi. p. 408⁴; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 79, t. 6. fig. 4⁵; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 57⁶.

Hab. MEXIQUE, Orizaba (*Saussure, H. H. Smith*), Atoyac en Vera Cruz, Teapa en Tabasco (*H. H. Smith*); GUATÉMALA, Ville de Guatémala (*Champion*); COSTA RICA (*Tonduz*); PANAMA (*Stretch*²).—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, Venezuela⁵, Brésil^{1 6}.