

Cette espèce, insuffisamment décrite par Smith, paraît cependant bien se rapporter au type décrit par Mayr. Le 1<sup>er</sup> nœud est à peine subbordé.

## 20. *Pseudomyrma delicatula*, sp. n. (Tab. IV. fig. 6, ♂.)

*Pseudomyrma flavidula*, Forel, Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 389 (♂)<sup>1</sup> (nec Smith).

♂. Long. 3.0 à 3.5 millim. Très voisine de la *P. flavidula*, dont elle n'est peut-être qu'une race. Elle s'en distingue par sa petite taille, sa sculpture faiblement réticulée, partout très luisante, la chitine transparente de l'abdomen et du pédicule, mais surtout par le thorax assez fortement convexe d'avant en arrière, avec les stigmates du segment intermédiaire et surtout ceux du métanotum très proéminents, et par le premier nœud beaucoup plus court du pédicule, lequel s'élève d'avant en arrière par une courbe plus rapide, assez uniforme. Le premier article du pédicule n'est nullement bordé; il a devant, en dessous, une petite dent distincte. La tête est un peu plus étroite derrière que devant. Couleur jaune un peu rougeâtre de la *P. flavidula*, avec deux taches brunes bien distinctes, oblongues, éloignées l'une de l'autre, latérales, près de la base de 1<sup>er</sup> segment abdominal.

♀. Long. 4.8 millim. Diffère de la *P. flavidula* comme l'ouvrière. La face basale du métanotum ne fait qu'une forte convexité avec la face déclive, tandis que chez la *P. flavidula*, ♀, les deux faces sont distinctes (quoique passant par une courbe de l'une à l'autre). Les deux taches de l'abdomen très noires et très démarquées.

*Hab.* MEXIQUE, Orizaba (*H. H. Smith*); COSTA RICA (*Tonduz*).—ANTILLES, Jamaïque (*Forel*), St. Vincent.<sup>1</sup>

J'ai trouvé cette espèce en masse à Kingston, Jamaïque, où elle fait son nid dans les rameaux secs des arbres sur lesquels elle court.

Les ♂ de St. Vincent qui j'ai signalés ailleurs comme *P. flavidula*<sup>1</sup> se rapportent à la *P. delicatula*, mais sont un peu plus grandes (3.6 millim.) et ont le thorax moins convexe.

*Var. panamensis*, n.

♂. Long. 4.2 millim. Fait un peu passage à la *P. flavidula*. Premier article du pédicule un peu moins court. Thorax un peu moins convexe. Du reste comme le type.

*Hab.* GUATÉMALA, Pantaleon (*Champion*) [♂].

[*Var. capperi*, n.

♂. De la taille de la forme typique, dont elle ne diffère que par son 1<sup>er</sup> article du pédicule assez distinctement bordé, un peu moins cependant que chez la *P. pallida*. Les segments abdominaux sont légèrement bordés de brun derrière. Du reste le 1<sup>er</sup> article du pédicule est court, comme chez la forme typique.

*Hab.* JAMAÏQUE (*M. S. H. Capper*).]

## 21. *Pseudomyrma distincta*.

*Pseudomyrma distincta*, Smith, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 63 (♂)<sup>1</sup>; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 56<sup>2</sup>.

*Hab.* MEXIQUE<sup>1 2</sup>.

Très rapprochée de la *P. ejecta*, mais la tête est noire, l'échancrure méso-métha-thoracique plus forte et la tête plus large. Les yeux se rapprochent plus du bord postérieur de la tête.