

Var. *pulchella*, n. (Tab. IV. fig. 7, ♂.)

Je ne crois pas faire erreur en déterminant comme variété de cette espèce une charmante petite *Pseudomyrma* qui correspond assez bien à la description de *P. distincta* de Smith. Mais le mésonotum de l'ouvrière est aussi noir et le thorax a une échancrure assez forte entre le mésonotum et le métanotum. La tête est rétrécie derrière et devant, un peu plus longue que large devant les yeux. Lobe de l'épistome presque nul. Luisante; thorax, tête et pattes faiblement réticulés. Pilosité et pubescence à peu près nulles. Long. 8.8 millim.

♀. Long. 5 millim. Le noir est plus brunâtre. Les cuisses postérieures sont aussi un peu brunâtres (chez l'ouvrière elles ont aussi quelques nuages un peu brunâtres). La sculpture est plus forte, surtout sur l'abdomen, et l'insecte est plus terne; du reste comme l'ouvrière.

Chez la ♂ et la ♀ de Teapa, le pétiole du 1^{er} article du pédicule est un peu plus long et la sculpture est plus forte (moins luisante).

Hab. MEXIQUE, Orizaba (*coll. Forel*), Teapa en Tabasco (*H. H. Smith*) [♂ ♀].

22. *Pseudomyrma salvini*, sp. n. (Tab. IV. fig. 8, ♂.)

♂. Long. 5.5 à 6.3 millim. Mandibules subopaques, extrêmement finement ponctuées et ridées, comme la tête, et munies de 3 dents distinctes devant. Épistome fortement convexe transversalement, distinctement lobé. Tête rectangulaire-ovale, fort convexe, à côtés convexes, rétrécie devant et derrière. Articles 3 et 4 du funicule un peu plus longs que larges. Les scapes atteignent la moitié de la distance de leur origine au bord occipital. Thorax échancré entre le pronotum et le mésonotum, mais nullement entre le mésonotum et le métanotum. Le pronotum est comme chez la *Sima grandidieri*, bordé, aussi long que large, presque aussi large derrière que devant, avec les angles antérieurs fort arrondis, presque plan ou à peine concave de droite à gauche, médiocrement convexe d'avant en arrière. Mésonotum plus long que large, subbordé, à côtés presque parallèles. Suture méso-métanotale à peine visible, presque nulle. Stigmates situés sur les pans latéraux du thorax. Métanotum étroit; son dos forme une convexité d'avant en arrière, tandis qu'il est presque plan transversalement. Il est subbordé; la face basale est de la même longueur que la face déclive. Le premier article du pédicule est courbé, c'est à dire fortement concave en dessous et longuement pétiole. C'est surtout le pétiole antérieur qui est courbé, et il porte dessous, devant, une petite dent pointue. Le nœud est pyriforme, comme celui du second article, fortement rétréci devant et élargi derrière, avec les côtés comprimés dans sa partie antérieure inférieure et la surface dorsale légèrement déprimée; il est cependant à peine subbordé.

Sculpture finement ponctuée des *Pseudomyrma*. Thorax et tête (sauf l'occiput) subopaques. Occiput luisant, plus éparsément ponctué. Abdomen et pédicule luisants, faiblement réticulés.

Pilosité presque nulle; quelques poils jaunâtres à l'extrémité de l'abdomen. Pubescence assez éparsée, plus abondante sur l'abdomen et les pattes, mais courte.

D'un jaune plus ou moins rougeâtre. Tête noire, sauf les mandibules, les antennes et le bord antérieur de l'épistome, qui sont d'un jaune pâle. Des nuages brunâtres plus ou moins accentués et transversaux sur l'abdomen, parfois aussi sur le pédicule.

♀. Long. 7.2 à 7.5 millim. Bord antérieur de l'épistome à peine brunâtre. Ailes jaune pâle. Pétiole du premier article du pédicule seul, mais fortement courbé. Du reste comme l'ouvrière. Le pronotum forme aussi un angle ou une échancrure avec le mésonotum; il est bordé, plus large que long.

♂. Long. 7.5 millim. Second article des funicules $2\frac{1}{2}$ fois plus grand que le 1^{er}, de la longueur du scape. Mandibules larges, grandes, dentées. Tête ovale, plus longue que large. Pronotum arrondi, non bordé. Pénicilles longs. Pygidium, hypopygium et valvules génitales extérieures arrondis. Du reste extrêmement semblable à la ♀ et de même couleur, c'est à dire aussi comme l'ouvrière ou avec le dos du thorax brunâtre. Le premier article du pédicule est aussi courbé, mais le nœud est moins élevé, moins distinct du pétiole.

Hab. MEXIQUE, Teapa en Tabasco (*H. H. Smith*) [♂ ♀ ♂].

Je ne puis garantir que ce ne soit l'une des espèces indéchiffrables de F. Smith, mais il vaut mieux risquer un synonyme que de faire de fausses identifications. Cette remarque s'applique aussi aux espèces qui suivent.