

23. *Pseudomyrma decipiens*, sp. n. (Tab. IV. fig. 9, ♂.)

♂. Long. 5.7 millim. Mandibules et épistome comme chez la précédente, mais l'épistome n'a qu'un lobe très court. Second article des funicules plus long que large; troisième aussi large que long. Scapes plus courts. Tête fort allongée, $1\frac{1}{4}$ fois plus longue que large (sans les mandibules, comme il s'entend toujours). Les yeux sont seulement un peu plus longs que l'espace qui les sépare de l'angle occipital. Tête rectangulaire-ovale à côtés peu convexes. Thorax largement et peu profondément échancré entre le mésonotum et le métanotum, long et étroit. Pronotum rectangulaire, plus long que large, subdéprimé, faiblement subbordé, sans épaules. Mésonotum arrondi, aussi long que large. Métanotum étroit, convexe en tout sens, à face basale un peu plus longue que la déclive. Premier article du pédicule entre celui de la *P. salvini* et celui de la *P. gracilis*, moins courbé, moins comprimé devant, moins renflé derrière et moins subbordé que chez la *P. salvini*. Abdomen allongé. Second nœud du pédicule presque aussi large que long. Une dent presque imperceptible sous le pétiole du premier nœud.

Très finement ponctuée, subopaque ou relativement luisante, partout à peu près de même. Pilosité presque nulle. Une pubescence très fine et jaunâtre fait un fin duvet grisâtre sur l'abdomen; ailleurs elle est très courte et diluée.

D'un jaune-rougeâtre. Base de l'abdomen et une bande sur les segments brunâtres. Mandibules et bord antérieur de la tête d'un jaune très pâle.

♀. Long. 7 millim. Comme l'ouvrière, sauf les différences du polymorphisme. Tête $1\frac{3}{4}$ fois plus longue que large. Les yeux sont longs comme la distance de leur bord postérieur au bord occipital.

Hab. MEXIQUE, Teapa en Tabasco (*H. H. Smith*).

24. *Pseudomyrma biconvexa*, sp. n. (Tab. IV. fig. 10, ♂.)

♂. Long. 4.0 à 5.6 millim. Mandibules avec deux dents pointues seules distinctes. Épistome extrêmement court, sans lobe ni échancrure. Arêtes frontales très rapprochées. Scapes longs comme un peu plus d' $\frac{1}{3}$ de la distance de son origine au bord occipital. Second article du funicule aussi large que long. Pas trace de sillon frontal. Tête $1\frac{1}{3}$ à $1\frac{1}{2}$ fois plus longue que large (sans les mandibules), ovalo-rectangulaire. Les yeux sont à peine plus longs que leur distance du bord occipital. Le thorax, fortement échancré entre le mésonotum et le métanotum et fort allongé, forme deux convexités à peu près de même longueur et qui, chacune, sont fortement convexes transversalement aussi bien que longitudinalement. Il n'y a pas trace de dépression du dos du thorax. Le pronotum, plus long que large, sans trace de bord ni d'épaules, forme la première convexité avec le mésonotum, qui est circulaire. Le métanotum forme la seconde; sa face basale est bien plus longue que la déclive. Le premier article du pédicule n'a qu'un pétiole très court; il est allongé, 2 fois plus long que large, faiblement élargi derrière, comprimé. Le second nœud est pyriforme, à peine plus long que large.

Luisante (surtout la tête), et très finement ponctuée. Une pilosité dressée, extrêmement fine et pointue, courte, assez éparsée, se voit partout, sur le corps et sur les membres. La pubescence adjacente, éparsée sur la tête, va en s'épaississant graduellement d'avant en arrière et forme sur l'abdomen un duvet dense et grisâtre qui cache entièrement l'éclat.

Tête d'un jaune rouge; de là la couleur devient graduellement de plus en plus foncée et plus terne d'avant en arrière. L'abdomen est brun. Les exemplaires de Pantaleon sont un peu plus grands et plus clairs. Mandibules et épistome d'un jaune pâle, presque blanchâtre. Antennes et tarses d'un jaune sale. Cuisses et tibias plus ou moins brunâtres.

Hab. GUATÉMALA (*Stoll*), Pantaleon (*Champion*); COSTA RICA (*Tonduz*).

25. *Pseudomyrma godmani*, sp. n. (Tab. IV. figg. 11, 11 a, ♂.)

♂. Long. 6.5 millim. Tête large de 1.6 millim., pronotum de 0.85 millim. Mandibules à bord externe peu convexe, à bord terminal tranchant, avec deux dents vers l'extrémité. Elles sont luisantes, avec de très gros points enfoncés, allongés, abondants. Épistome caréné, faiblement lobé, biéchancré, peu convexe. Tête déprimée, plus large que longue, avec les yeux encore plus proéminents latéralement que chez la *P. gracilis*. Bord postérieur de la tête droit ou un peu convexe. La tête est large derrière, fortement