

rétrécie devant, en somme (avec les mandibules) assez triangulaire-arrondie. Les scapes atteignent les $\frac{2}{3}$ de la distance entre leur origine et le bord occipital. Tous les articles du funicule plus longs que larges. Les yeux sont énormes et occupent plus de la moitié des côtés de la tête. Thorax court, à dos large, et fortement bordé d'un bord aigu sur toute sa longueur. Pronotum $2\frac{2}{3}$ fois plus large que long, plan, bordé aussi à son bord antérieur et avec deux angles antérieurs légèrement obtus, mais vifs. Mésonotum $2\frac{1}{2}$ fois plus large que long. Sutures profondes, mais pas d'étranglement du thorax. Le métanotum, fort large, ne forme guère qu'une convexité d'avant en arrière; sa face déclive plus longue que la basale. Il n'est que très faiblement rétréci en arrière. Premier article du pédicule avec un court pétiole et un nœud élevé, transversal ou subsquamiforme, arrondi en haut, presque deux fois plus large que long. Second article cupuliforme, derrière presque deux fois plus large que long.

Tête et thorax densément et profondément réticulés-ponctués et à peu près mats. Épistome peu sculpté, assez luisant. Sur le vertex et surtout sur le métanotum, les réticulations se transforment en partie en rides longitudinales serrées. Les côtés du thorax sont subopaques, glabres et moins fortement réticulés. Pédicule et abdomen assez luisants, bien plus faiblement réticulés, avec une ponctuation fine, comme celle des autres *Pseudomyrma*. Pattes luisantes, réticulées.

Une pilosité dressée, pointue, d'un brun noirâtre, assez abondante sur le corps et sur les membres (y compris scapes et tibias). Pubescence grisâtre assez diluée, ne cache pas la sculpture de l'abdomen, où elle est plus abondante.

Noire. Abdomen et pédicule d'un brun foncé, noirâtre. Pattes, antennes et mandibules brunes.

Hab. PANAMA, Bugaba (*Champion*).

Cette curieuse espèce ressemble un peu à la *P. künckeli*, dont elle diffère du reste énormément.

26. *Pseudomyrma championi*, sp. n.

♂. Long. 4.7 millim. Le premier aspect rappelle la *P. elegans*, dont elle est du reste absolument différente. Forme de la tête et longueur des scapes comme chez la *P. decipiens*, mais les yeux sont plus petits, plus courts que leur distance au bord occipital, et les articles du funicule sont tous plus larges que longs, sauf le premier. Mandibules avec deux dents devant et des denticules irrégulières derrière; elles sont striées et finement réticulées-ponctuées entre les stries. Une apparence de sillon frontal jusqu'à la hauteur du bord postérieur des yeux. Dos du thorax étroit, à peine subdéprimé, assez convexe transversalement, rectiligne ou subrectiligne longitudinalement, sauf le devant, un peu convexe, du pronotum. Ce dos étroit n'est subbordé qu'au pronotum et n'a aucune échancrure. Les angles antérieurs du pronotum sont arrondis. Le pronotum et la face basale du métanotum, surtout celle-ci, sont bien plus longs que larges. Le mésonotum est à peine plus large que long. Le pronotum est à peine plus large devant que derrière, et seulement un peu plus large que le métanotum. La face basale du métanotum est $1\frac{3}{4}$ fois plus longue que la déclive, à laquelle elle passe par une courbe assez brusque. Premier nœud du pédicule un peu courbé, avec un pétiole médiocre qui passe peu à peu au nœud sans limite nette. Ce dernier s'élargit et s'élève graduellement et atteint son maximum de largeur et de hauteur à son tiers postérieur; il est de nouveau rétréci derrière. Un peu subdéprimé dessus, il n'est nullement bordé ni subbordé. Second nœud pyriforme, large derrière.

Tête et thorax densément et fortement ponctués et mats ou subopaques. Pédicule et abdomen faiblement réticulés et luisants. Quelques poils courts, très fins, jaunâtres, très épars sur le corps et sur les membres. Pubescence pruinée, jaunâtre, formant sur l'abdomen un très léger duvet, fort éparse ailleurs.

Thorax et premier nœud du pédicule rougeâtres. Tête et abdomen d'un noir brunâtre. Pattes, antennes et premier nœud du pédicule brunâtres. Mandibules, épistome, antennes et tarses d'un jaune plus ou moins brunâtre.

Hab. MEXIQUE, Amula en Guerrero (*H. H. Smith*), Guanajuato (*E. Dugès*).