

Elle est très pusillanime, se cache et s'enfuit, même lorsqu'on détruit son nid. Elle ne répand pas d'odeur et vit en fourmilières peu considérables.

Var. *nigriventris*.

*Dolichoderus lutosus*, Smith, var. *nigriventris*, Forel, Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 351<sup>6</sup>.

*Hab.* GUATÉMALA, Torola, Zapote (*Champion*) [ ♂ ].—ANTILLES, St. Vincent<sup>6</sup>.

### 5. *Dolichoderus championi*, sp. n.

♀. Long. 6 millim. Très semblable au *D. lutosus*, mais plus grand, et poilu. Mandibules plus longues, à bord externe distinctement concave. Tête ovale, plus rétrécie derrière où elle n'est que faiblement échancrée. Mésonotum presque d' $\frac{1}{3}$  plus long que large, subbordé (aussi large que long et bordé chez le *D. lutosus*). Profil du pronotum et du mésonotum réunis assez fortement convexe (à peine convexe chez le *D. lutosus*). Métanotum comme chez *D. lutosus*, mais tronqué devant presque à angle droit par un pan qui tombe verticalement sur l'échancrure, tandis que le mésonotum s'y abaisse par une courbe (chez le *D. lutosus* c'est parfois plutôt le contraire). Écaille comme chez le *D. lutosus*, mais plus large en haut, quoique courbée de même façon. Les scapes dépassent l'occiput d'un quart de leur longueur (le dépassent à peine chez le *D. lutosus*). Pattes plus longues.

Sculpture comme chez le *D. lutosus*, mais les points de l'abdomen sont piligères et les points réticulaires du thorax sont plus luisants et un peu plus grossiers.

Tout le corps, les pattes et les antennes abondamment couverts d'une pilosité dressée très fine, jaunâtre et pointue. Pubescence très diluée.

D'un rouge brunâtre terne. Abdomen noir, sans tache, avec l'extrémité parfois brune.

♀. Long. 8.5 millim. Comme l'ouvrière; tête plus échancrée derrière. Sculpture un peu plus forte. Tête et thorax variés de rougeâtre et de brunâtre. Hanches et base des cuisses d'un jaunâtre sale; tibias bruns. Abdomen noir, avec les deux derniers segments rouges. Ailes teintées de brunâtre; nervures d'un brun jaunâtre; tache marginale brune.

♂. Long. 5.5 millim. D'un roux jaunâtre; hanches, cuisses et les deux derniers segments de l'abdomen jaunâtres; reste de l'abdomen noir. Métanotum arrondi et fort convexe, sans arêtes ni bords. Écaille comme chez la ♀ et l'ouvrière, mais moins courbée et plus épaissie à sa base. Ailes plus pâles que chez la ♀. Sculpture plus faible que chez l'ouvrière; pilosité plus courte et moins abondante; du reste semblables.

*Hab.* MEXIQUE, Teapa en Tabasco (*H. H. Smith*); COSTA RICA (*Tonduz*) [ ♂ ♀ ]; PANAMA, Caldera en Chiriqui (*Champion*) [ ♀ ♂ ].

[Race *trinidadensis*, n. st.

♀. Long. 5.3 à 5.5 millim. Bien plus svelte que le type. Tête bien plus étroite, beaucoup plus longue que large, à peine échancrée au milieu de son bord postérieur. Pronotum et mésonotum bordés et à profil à peine voûté (comme chez le *D. lutosus*), mais le mésonotum est presque deux fois plus long que large.

Tête et thorax assez luisants; tête seulement réticulée, avec des rides longitudinales assez grossières sur l'épistome (ces rides sont à peine marquées chez le *D. championi* typique).

Brunâtre; abdomen d'un brun foncé; écaille, pronotum, mésonotum, épistome, extrémité des mandibules, funicules, hanches et une partie des cuisses et des tarses d'un jaunâtre terne, plus ou moins roussâtre ou brunâtre. Bord postérieur des segments abdominaux jaunâtre. Pilosité et le reste comme le type.

*Hab.* AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, Trinidad (*Urich*).

Cette race du *D. championi* vit en fourmilières plus considérables que le *D. lutosus*, dans le bois; elle est aussi fort timide, quoique un peu moins et ne répand pas d'odeur. J'en ai trouvé une fourmilière habitant un poteau de bois, dans une plantation de bananes, au milieu de la forêt, près de Rio Frio, en Colombie (Sierra Nevada de Santa Marta), mais c'est une variété un peu différente que j'appelle *D. tæniatus* ]