

[Race *trinidadensis*, var. *toniatus*, n.

♂. Jaune vif, avec la tête un peu plus rougeâtre. Une bande transversale brune à l'extrémité de chaque segment abdominal.

♀. Long. 7.5 à 8 millim. Ailes fort poilues, faiblement teintées de brunâtre. Couleur de l'ouvrière. Du reste comme le ♀ du *D. championi* typique.

Hab. COLOMBIE, Ouriheka, près Rio Frio, et Naranjo, pied de la Sierra Nevada (*Forel*).]

TAPINOMA.

Tapinoma, Förster, Hymen. Stud. i. p. 43 (1850) ; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 164.

Les *Tapinoma* répandent pour la plupart une odeur volatile spéciale, due à la sécrétion de leurs glandes anales. (Voir *Forel*, "Fourmis de la Suisse," Nouv. Mém. Soc. helv. des Sci. Nat. 1874.)

[1. *Tapinoma sessile*.

Formica sessilis, Say, Boston Journ. Nat. Hist. i. p. 287 (♀) (1836)¹ ; Complete Writings, ii. p. 732².

Tapinoma sessilis, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 57 (1858)³.

Tapinoma sessile, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvi. p. 434 (1886)⁴.

Formica parva, Buckley, Proc. Ent. Soc. Phil. vi. p. 159 (1866)⁵.

Hab. AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE, États Unis du Sud^{1 2 3 5} ; BASSE CALIFORNIE, Ile de Margarita et San Jorge (*Eisen et Haines*).]

2. *Tapinoma melanocephalum*.

Formica melanocephala, Fabr. Ent. Syst. ii. p. 353 (1793)¹.

Lasius melanocephalus, Fabr. Syst. Piez. p. 417 (1804)².

Myrmica melanocephala, Lepel. Hist. Nat. Ins. Hymén. i. p. 185 (1836)³.

Tapinoma melanocephalum, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xii. p. 651 (1862)⁴ ; Pergande, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) v. p. 870⁵.

Micromyrma melanocephala, Roger, Berl. ent. Zeitschr. vi. p. 258 (♂ ♀) (1862)⁶.

Formica nana, Jerdon, Madras Journ. of Lit. & Sci. xvii. p. 125 (1851)⁷.

Myrmica pellucida, Smith, Journ. Linn. Soc., Zool. ii. p. 71 (1857)⁸.

Myrmica (Monomorium) pellucida, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 124 (1858)⁹.

Formica familiaris, Smith, Journ. Linn. Soc., Zool. iv., Suppl. p. 96 (1860)¹⁰.

Hab. MEXIQUE, San Blas (*Eisen et Haines*⁵).—ZONA TORRIDA ORBIS TERRARUM.

3. *Tapinoma anale*.

Tapinoma anale, André, Rev. d'Ent. 1893, p. 148 (♂)¹.

Hab. BASSE CALIFORNIE, San Julio (*Eisen*).—MEXIQUE, Terraras, État de Chihuahua¹.

Pergande considère cette espèce comme variété du *Tapinoma pruinosum*, Roger, de Cuba, mais sans en donner les raisons.