

4. **Tapinoma ramulorum.**

Tapinoma ramulorum, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxviii. p. 101 (♂ ♀ ♂) (1896)¹.

Hab. COSTA RICA, San José (*Alfaro*¹).

Trouvée dans les rameaux secs d'un arbre (*Vernonia brachiata*, Benth.).

5. **Tapinoma piceatum.**

Camponotus (Tapinoma) piceatus, Norton, Proc. Essex Institute, vi., Comm. p. 3 (♀) (1868)¹.

Tapinoma piceata, Norton, Amer. Nat. ii. p. 60².

Tapinoma piceatum, Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 166³.

Hab. MEXIQUE¹⁻³.

Espèce douteuse.

IRIDOMYRMEX.

Iridomyrmex, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xii. p. 702 (1862); Dalla Torre, Cat. Hymen vii. p. 168.

1. **Iridomyrmex dispertitus.**

Iridomyrmex dispertitus, Forel, Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. (2) xx. p. 351 (♂ ♂) (1884)¹; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 168².

Hab. GUATÉMALA², Tecpam 7000' (*Stoll*¹); PANAMA, Volcan de Chiriqui (*Champion*) [♂ ♂].

2. **Iridomyrmex iniquus.**

Hypoclinea iniqua, Mayr, Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, lxi. p. 392 (♀), tab. fig. 10 (1870)¹.

Hypoclinea (Iridomyrmex) iniqua, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xx. p. 958².

Hab. COLOMBIE^{1 2}.

Var. *nigellus*.

Iridomyrmex iniquus (Mayr), var. *nigellus*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 56 (♀) (1890)³; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 169⁴.

Hab. COSTA RICA^{3 4} (*Tonduz*).

L'*I. iniquus*, que j'ai observé souvent en Colombie, fait son nid dans la terre, à la façon des *Dorymyrmex*. Nymphes nues, comme chez tous les Dolichoderinæ.

FORELIUS.

Forelius, Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. xlv. p. 389 (1888); Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 168.

1. **Forelius mac-cooki.**

Iridomyrmex mac-cooki, Forel, Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. xv. p. 382 (1878) (sine descr.)¹; MacCook, Comstock's Report on Cotton-insects, p. 187, fig. 36 (1879)²; Forel, Compt. rend. Soc. Ent.