

minor de l'*A. sericea*. Cependant on peut lui conserver ce nom pour en finir avec les changements de nom et parce qu'il n'y a rien de plus certain à attendre.

L'*Azteca instabilis*, v. *major*, vit dans les arbres. Elle est extrêmement guerrière. C'est elle j'ai vu mettre une armée d'*Eciton hamatum* en déroute. Lorsqu'on frappe son arbre, on l'entend faire un grand bruit à l'intérieur et en courant sur l'écorce. Elle est commune en Colombie. Son nid est à l'intérieur des troncs des grands arbres. Je ne sais si elle y fait du carton.

2. *Azteca velox*, sp. n. (Tab. IV. fig. 13, ♀.)

Azteca cæruleipennis, Emery, var. *fasciata*, Pergande, Proc. Cal. Acad. Sci. (2) v. p. 867 (1895)¹.

Cette forme est complètement différente de l'*A. cæruleipennis* (d'après le type de Pergande). Comme il existe déjà une *A. fasciata*, Emery, plus ancienne, elle doit être renommée.

♀. Long. 2.4 à 4.2 millim.

♀ *major*. Mandibules luisantes, ponctuées, assez épaisses, armées de 8 à 9 dents subégales. La tête a la forme de l'*A. instabilis* dessinée par Emery dans sa monographie, mais un peu plus rétrécie devant (cordiforme) et un peu moins courte (plus allongée surtout que chez la v. *major* de l'*A. instabilis*), avec les côtés à peine plus convexes. Trois ocelles chez la ♀ *major*. Les scapes dépassent un peu l'occiput. Bord antérieur de l'épistome presque droit. Articles du funicule distinctement plus longs que larges. Thorax faiblement convexe, un peu plus, cependant, que chez l'*A. delpini*, de sorte que les deux sutures sont mieux marquées. Écaille très semblable à celle de l'*A. instabilis*, convexe devant, concave derrière et assez acuminée en haut. Pattes longues et fortes.

L'éclat et la ponctuation sont à peu près comme chez l'*A. instabilis*—un peu plus luisante, mais peu de chose.

La pilosité et la pubescence sont comme chez l'*A. instabilis*, encore un peu plus abondantes.

Testacée, avec le front, le vertex, l'occiput et le dos du thorax brunâtres, ou bien l'abdomen, les tarses et les tibias sont seuls testacés pâles, le thorax, le front, le vertex et l'occiput d'un brun noirâtre, les cuisses, les hanches et les funicules brunâtres, le reste rougeâtre.

♀ *minor*. Fort peu différente de la ♀ *major*, mais plus foncée, de la couleur des ♀ *major* les plus foncées avec l'abdomen et les tibias en plus bruns. Les mandibules, l'épistome, les joues et les côtés de la tête demeurent presque toujours rougeâtres, le reste devenant presque noirâtre chez les ♀ *minimæ*. La tête n'est que peu élargie derrière et a les côtés un peu moins convexes que chez la ♀ *major*; elle est encore assez échancrée derrière. Les articles des funicules sont un peu plus longs que larges.

♂. Long. 4.1 à 4.4 millim. Mandibules droites, pointues, sans dents. Antennes comme chez l'*A. cæruleipennis* figurée par Emery. Mais la tête n'est pas rétrécie derrière les yeux et a un bord postérieur large. Métanotum fort arrondi, avec la face basale très courte. Valvules génitales extérieures jaunâtres, larges à la base, acuminées à l'extrémité qui est brune. Ailes hyalines. Pilosité bien moins abondante que chez l'ouvrière. Entièrement noirâtre. Pattes et antennes brunes. Valvules génitales et mandibules jaunâtres.

♀. Long. 11 millim. Mandibules armées de 7 dents, réticulées avec de gros points abondants. Tête comme chez la ♀ *major*, mais un peu moins rétrécie devant, à peine échancrée derrière, aussi large que longue. Thorax fortement convexe, un peu plus large que la tête; métanotum très convexe. Écaille élevée, amincie au sommet. Tête et scapes presque mats, très densément ponctués. Ailes jaunâtres avec les nervures et la tache marginale brunes. Du reste sculpture, pilosité et couleur de la ♀ *major*, mais les segments abdominaux sont bruns avec la base et le bord postérieur jaunâtres.

Hab. MEXIQUE, Santiago Iscuintla (*Eisen et Vasilit*¹); COSTA RICA (*Tonduz*); PANAMA, Bugaba (*Champion*).—COLOMBIE, pied de la Sierra Nevada (*Forel*).