

[Var. *nigriventris*, n.]

♂ *major*. Mandibules, devant et côtés de la tête, scapes et tarses rougeâtres. Le reste noir ou d'un brun noirâtre.

♂ *minor*. L'épistome, les joues, les mandibules et la moitié basale du scape sont seuls rougeâtres.

♀. Long. 10 millim. Diffère de l'*A. velox*, typique, par son abdomen entièrement noir, ses ailes subhyalines, ses mandibules densément réticulées, subopaques et son mésonotum moins densément ponctué, plus luisant.

Hab. COLOMBIE, pied de la Sierra Nevada, et San Antonio 1000 mètres (*Forel*).]

[Var. *trinidensis*, n.]

♂ *major*. Long. 4.2 à 4.7 millim. Mandibules subopaques, finement réticulées-ponctuées. Stature un peu, plus grande et couleur plus claire que chez le type. Testacée avec le dessus du corps faiblement brunâtre. Les scapes dépassent à peine l'occiput. Du reste identique à la forme typique. Les ocelles des ♂ *major* très distincts.

♀. Long. 9.5 millim. Mandibules armées de 7 dents. Écaille fort élevée, avec un sommet très mince et étroit, acuminé.

D'un brun foncé; vertex brun. Le reste de la tête, les antennes, les tarses et les articulations des pattes roussâtres. Mandibules d'un brun roussâtre. Dessous de l'abdomen et bord des segments jaunâtres.

Hab. TRINIDAD (*Urich*).]

Cette espèce, extrêmement commune, la plus commune de toutes en Colombie, a dû être confondue avec la ♂ *minor* de l'*A. instabilis*. Cependant, malgré ses affinités avec cette espèce, à côté de laquelle elle vit, il est impossible de la confondre avec elle, lorsqu'on l'observe à l'état de nature. La différence de taille est énorme, et je n'ai jamais trouvé de formes intermédiaires qui devraient se trouver s'il ne s'agissait que de variétés. Elle est très voisine de l'*A. delpini* du Brésil, qui est plus svelte, a le thorax bien moins convexe et la couleur testacée.

L'*A. velox* vit dans tous les arbres possibles lorsqu'ils sont creux, même dans des troncs pourris et tombés. Elle court avec une agilité incroyable et est fort agressive. Les mœurs sont tout-à-fait analogues à celles de l'*A. instabilis*, dont elle forme la petite édition. On la reconnaît de loin à son abdomen jaune clair qu'elle agite en tout sens. La ♂ *major* ne dépasse jamais 4.2 millim. Je n'ai pas trouvé de carton chez la forme typique, quoique j'aie démolé un tronc où il y avait des ♂ et des nymphes nues. Par contre à St. Antonio, en plongeant la main dans le tronc creux où se trouvait un nid de la var. *nigriventris*, j'en ai retiré quelques débris d'un carton assez épais, à grain assez fin, adhérent au bois naturel, ainsi que quelques ♀. Les ♂ m'attaquèrent avec rage. Cependant ces observations sont trop fragmentaires. Il faudrait couper les énormes arbres où sont leurs grandes fourmilières pour tirer au clair la question du carton.

3. *Azteca sericea*.

Iridomyrmex sericeus, Mayr, Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, liii. p. 498, fig. 8 (♂) (1866)¹.

Azteca sericea, Emery, in litt.²; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 164³.