

aux Antilles une race qui est la première *Azteca* trouvée dans ces îles (sauf Trinidad, qui a la faune continentale de l'Orénoque).

[Race *antillana*, n. st.

♂. Long. 2.5 à 3.5 millim. Entièrement d'un jaune testacé pâle, moins luisant que chez la forme typique, avec la tête d'un jaune plus foncé et les mandibules rougeâtres. L'écaille est moins élevée et n'est pas tranchante à son bord supérieur, qui est faiblement arrondi; sa face postérieure est plane, nullement concave. Le dimorphisme entre la ♀ major et la ♀ minor est à peine sensible, le dos du thorax très faiblement convexe. Les articles du funicule sont comme chez la forme typique, plus étroits et plus allongés que chez l'*A. velox*. Les mandibules sont luisantes et n'ont que quelques stries très faibles et effacées (finement et assez densément striées chez le type de l'*A. delpini*). Pilosité un peu plus fine, moins apparente que chez l'*A. delpini*. Les mandibules ont 8 dents assez égales et le bord externe peu courbé. Pubescence un peu plus abondante que chez l'*A. delpini*, i. sp. Du reste comme cette dernière.

Hab. ANTILLES, St. Lucia (*Forel*).

Je l'ai trouvée habitant dans les troncs des arbres creux, comme les *A. instabilis* et *A. velox*, courant extrêmement vite, et faisant la chasse à tout.]

[Race *antillana*, var. *guadeloupensis*, n.

♂. Diffère de la précédente par ce qu'elle est moins luisante encore, un peu plus pubescente et parce qu'elle a le vertex, l'occiput et le dessus du thorax faiblement brunâtres.

Hab. ANTILLES, Pointe à Pitre, Guadeloupe (*Forel*).]

9. *Azteca foreli*.

Azteca forelii, Emery, Mem. Accad. Sci. Bologna, (5) iii. p. 337 (♂) (1893)¹.

Hab. COSTA RICA, Bagaces¹.

[Var. *xysticola*, n.

♂. Plus foncée, brunâtre et avec la tête des ♀ major à peine plus large derrière que devant. Les ♀ minima ont 2.7 millim., les maxima 4.4.

Hab. COLOMBIE, pied de la Sierra Nevada de Santa Marta (*Forel*).

Je l'ai trouvée à Bonda, dans la forêt, dans des galeries de carton serpentant sur de gros rochers granitiques qui se trouvaient sur le sol, et à Santa Marta dans des galeries de carton qui avaient tout l'air d'être celles du *Cremastogaster stoll*i. En examinant le carton des galeries de Bonda, je ne puis le trouver foncièrement différent de celui du *C. stoll*i, de sorte que je soupçonne l'*Azteca foreli* de dérober ses galeries au *C. stoll*i. Cependant ce n'est qu'une supposition et je fais peut-être tort à l'*Azteca*.]

Var. *eiseni*.

Azteca eiseni, Pergande, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) v. p. 868 (♂) (1895)².

Hab. MEXIQUE, Santiago Iscuintla (*Eisen*²).

C'est une simple variété de l'*A. foreli*, voisine de l'*A. xysticola*, mais avec les scapes plus courts, la couleur brunâtre et le métanotum bas, à peine convexe.