

Mandibules opaques striées. Je ne comprends pas comment M. Pergande peut lui trouver de la ressemblance avec l'*A. angusticeps*. Je possède un type.

[Race *championi*, n. st.

♂. Ressemble à la variété *xysticola*, par la forme de la tête et la couleur, mais diffère d'elle et de l'espèce typique par ses mandibules luisantes, faiblement réticulées vers la base et avec de gros points épars. En outre le thorax est encore plus trapu et la face basale du ménotum un peu plus convexe. Les dents des mandibules sont aussi plus égales. Même taille que la var. *xysticola*.

Hab. COLOMBIE, Dibulla, pied de la Sierra Nevada de Santa Marta (*Forel, Lallemand*).]

Race *championi*, var. *breviscapa*, n.

♂. Scapes fort loin d'atteindre le bord occipital de la tête, et le pronotum moins robuste que chez le type de la race *championi*, chez lequel il forme de chaque côté (♂ maxima) une protubérance mousse.

Hab. COSTA RICA (*Tonduz*).

Trouvée par M. Tonduz dans des *Cecropia*.

[Race *ursina*, n. st.

♂ *major*. Long. 4 à 4.6 millim. Épaisse, trapue, pattes courtes, ménotum convexe. Tête à peine rétrécie devant, à peine plus longue que large, avec les côtés un peu convexes. Épistome faiblement bisinué. Couleur brunâtre, avec le devant de la tête seulement un peu plus clair. Pilosité nulle sur les tibias, très rare sur les scapes. Mandibules assez mates, très finement réticulées-ponctuées et striolées, avec des points épars. Pubescence plus longue et plus abondante sur la tête que chez les autres races.

♂ *minor*. Long. 2½ à 3 millim. Mêmes différences que pour la ♂ *major*. Tête au moins aussi large que longue, à côtés convexes. Les scapes atteignent à peine l'occiput. Les funicules sont épais; leurs articles médians sont bien plus épais que longs.

L'ouvrière de cette race diffère surtout par sa tête moins rétrécie devant, à pubescence plus forte et sa couleur foncée.

♂. Long. 4.2 à 4.6 millim. Mandibules tranchantes, avec une pointe très aiguë. Tête en carré arrondi. Scape aussi large que long. Premier article du funicule bien plus large que long, en ovale transversal. Second article du funicule très long et très épais, deux fois plus long qu'épais. Les autres articles, un peu plus longs qu'épais, vont en diminuant d'épaisseur de la base à l'avant dernier. Écaille verticale, presque acuminée. Valvules génitales extérieures assez grandes, arrondies, acuminées d'une longue pointe mousse. Valvules moyennes avec un long prolongement dorsal et un angle ou une courte dent ventrale.

Noir, luisant; pilosité de l'ouvrière, pubescence moindre; tarses, bouche et valvules génitales d'un jaune brunâtre. Ailes presque hyalines, avec les nervures brunâtres.

Hab. TRINIDAD (*Urich*).]

10. *Azteca alfaroi*.

Azteca alfari, Emery, Mem. Accad. Sci. Bologna, (5) iii. p. 138 (♂) (1893)¹.

Hab. COSTA RICA, Jiménez¹; PANAMA, Bugaba (*Champion*) [♂].—COLOMBIE, Santa Marta (*Forel*).

M. Champion a trouvé cette espèce à Panama dans les cavités du tronc d'un *Cecropia*, comme M. Alfaro à Costa Rica. Moi-même je l'ai trouvée près de Santa Marta, sur un *Cecropia* dans lequel elle avait son nid. Elle m'attaqua avec fureur lorsque je me