

mis à la récolter. Chez la ♂ minima, le funicule est brun, sauf le 1^{er} article. La ♀ maxima a la tête un peu moins rétrécie devant que sur la figure d'Emery; elle a 3.3 millim.

Race *lucidula*, n. st.

- ♂. Long. 2.6-2.9 millim. Bien plus luisante, plus faiblement sculptée que le type. Échancrure thoracique large et peu profonde; mésonotum et métanotum peu convexes. Tête plus étroite, et un peu plus allongée. Stature un peu plus grêle. Les articles des funicules plus épais que longs, surtout vers l'extrémité.
- ♀. Long. 7.5 millim. Densément ponctuée, à peine luisante. Très semblable à celle de l'*A. bicolor* et de même couleur noire (voir figure d'Emery), mais les côtés de la tête sont plus convexes; tête aussi large devant que derrière. Écaille plus basse et plus épaisse que chez l'*A. bicolor*. Thorax un peu plus large. Les ailes sont presque hyalines, avec la tache marginale brune et les nervures d'un jaune brunâtre (chez l'*A. bicolor* les ailes sont teintées de jaune brunâtre).
- ♂. Long. 2.5 à 2.9 millim. Mandibules très courtes, en pointe, ne s'atteignant pas l'une l'autre au milieu. Tête rectangulaire arrondie, plus longue que large. Scape plus épais que long, de même que le 1^{er} article du funicule. Articles 6 à 10 du funicule presque plus larges que longs. Écaille du pédicule mince. L'appendice dorsal des valvules génitales moyennes dépasse les valvules extérieures, qui sont acuminées. Ailes assez longues, subhyalines, du reste comme chez la ♀.

Hab. GUATÉMALA, Retalhuleu (*Stoll*).—TRINIDAD (*Urich*).

Tandis que la ♀ est presque identique à celle de l'*A. bicolor*, le ♂ est tout-à-fait différent. Je soupçonne que cette race pourrait bien être une espèce distincte de l'*A. alfaroi*. Sur vingt-deux ouvrières il n'y a presque pas de différence entre ♂ major et minor. Est-ce pour toutes le cas, ou la ♂ major me manque-t-elle?

Race *lucida*, n. st.

- ♂ *minor*. Identique à la ♂ de la race précédente, mais thorax un peu plus voûté (plus semblable au type), couleur plus terne et funicules bruns, sauf le 1^{er} article.
- ♂ *major*. Long. 4.2 millim. Tête longue de 1.6 millim. et large de 1.25, fort semblable à la figure qu'Emery donne de l'*A. bicolor*, ♂ major, mais plus rétrécie devant et un peu moins allongée. Les scapes sont éloignés des angles occipitaux comme la moitié de leur longueur. Articles du funicule un peu plus longs que larges, sauf l'avant dernier. Tête profondément échancrée derrière, à côtés faiblement convexes. Segments abdominaux bordés de jaunâtre. D'un jaune rougeâtre. Tête (sauf le devant rougeâtre) d'un brun rougeâtre. Abdomen et funicules, sauf le 1^{er} article, brunâtres. Segments abdominaux jaunâtres postérieurement. Tête faiblement pubescente, très luisante, très faiblement ponctuée (points abondants, mais effacés).

Hab. GUATÉMALA, Pantaleon 1700' (*Champion*).

Trouvée dans les cavités du tronc d'un *Cecropia*. Est-ce simplement la ♂ major d'une variété de la race *lucidula*? Est-ce une autre espèce, voisine de la *A. bicolor*, r. *belti*? On le saura quand on connaîtra tous les sexes. J'incline vers la dernière idée, mais alors il faut savoir si la *lucidula* n'est pas dans le même cas!

Diffère de l'*A. fasciata* (♂ major) par sa taille plus grande, sa tête à échancrure plus profonde et plus étroite, avec les lobes occipitaux plus distincts et plus arrondis, avec les côtés bien plus convexes, le bord antérieur de l'épistome distinctement concave (droit chez l'*A. fasciata*).