

11. *Azteca godmani*, sp. n.

♀. Long. 9.5 millim. Mandibules armées de 8 à 9 dents, à bord externe peu convexe, subopaques, très finement réticulées-punctuées, avec de gros points épars. Tête plus large que longue, fortement rétrécie devant et très élargie derrière, où elle est assez fortement échancrée, à côtés fort convexes. Yeux situés au tiers antérieur. Épistome à peine bisinué devant. Aire frontale distincte. Scapes courts, n'atteignent pas l'occiput. Articles 6 à 10 du funicule au moins aussi épais que longs. Écaille en coin, élevée et inclinée en avant, faiblement échancrée au sommet.

Assez luisante, finement réticulée, en partie ponctuée.

La pubescence fine et courte, répandue partout, forme un léger duvet grisâtre assez clair pour ne cacher nullement la pubescence. Pilosité dressée, jaunâtre, assez longue et assez abondante sur le corps, les pattes et les scapes.

D'un brun noirâtre. Écaille, mandibules, pattes, devant de la tête et une bande longitudinale latérale entre les yeux et les arêtes frontales d'un brun rougeâtre ou d'un rouge brunâtre. Antennes, tarses et articulations des pattes roussâtres. Bord des segments abdominaux jaunâtre. Ailes teintées de brun roussâtre; nervures et tache brunes.

Hab. PANAMA, Bugaba (*Champion*) [♀].

Rapprochée de l'*A. trigona*, Emery, mais plus grande, poilue, à tête plus échancrée etc. L'*A. trigona* n'a pas de pilosité aux scapes, ni aux tibias.

12. *Azteca tonduzi*, sp. n.

♀. Long. 2.5 à 2.6 millim. Selon toutes les apparences monomorphe, car j'en ai reçu un nombre considérable, avec des ♂ et des nymphes, toutes de même taille.

Mandibules armées à leur bord terminal de 8 à 9 dents un peu inégales, mais les dents se continuent sur le bord interne, qui en a encore 3 ou 4. Mandibules lisses, luisantes, ponctuées, avec la base réticulée; bord externe fortement convexe. Tête assez cordiforme, à côtés convexes, aussi large que longue, assez fortement échancrée, fortement rétrécie devant. Bord antérieur de l'épistome convexe et avancé au milieu, faiblement bisinué de côté. Yeux situés aux $\frac{2}{5}$ antérieurs. Les scapes dépassent à peine l'occiput. Le thorax n'a pas trace d'étranglement, moins encore que chez l'*A. delpini*. Le pronotum est assez convexe devant, puis le dos du thorax est presque rectiligne en profil jusqu'à la face déclive du métanotum, qui ne forme elle-même qu'un angle très obtus et arrondi avec la face basale (elle est très faiblement inclinée). L'écaille est très basse et très inclinée, plus basse encore que chez l'*A. alfaroi*, mais anguleuse comme chez l'*A. bicolor*, étroite. Pattes moyennes; stature d'un petit *Tapinoma erraticum*.

Assez luisante, très finement ponctuée. Pubescence jaunâtre, formant partout un duvet très fin, qui ne cache pas la sculpture. Pilosité dressée, jaunâtre, très courte, surtout sur les tibias et sur les scapes, espacée. D'un brun jaunâtre sale, très terne, presque sans couleur; tête et abdomen plus brunâtres; pattes et scapes plus pâles. Chitine délicate. Aspect d'un *Tapinoma*.

♂. Long. 2.4 à 2.5 millim. Mandibules très étroites et courtes, ne se rejoignant pas au milieu, n'ayant qu'une dent pointue au bout. Tête plus large devant que derrière, un peu plus large que longue, avec un bord postérieur et des angles occipitaux très arrondis, mais distincts. Les yeux tout près du bord antérieur. Antennes courtes. Scape aussi large que long. Premier article du funicule plus large que long. Les autres vont, comme chez les autres espèces, en diminuant d'épaisseur et de longueur à partir du second. Métanotum à face basale très courte et à face déclive assez haute et longue. Valvules génitales extérieures larges à la base, acuminées; mais leur pointe est courte, triangulaire, poilue et dépassée par le prolongement long et étroit des valvules moyennes ainsi que par les valvules intérieures. Ailes faiblement teintées de brun. Le ♂ a les caractères typiques du genre.

Moins pubescent que l'ouvrière; pilosité et sculpture comme chez elle. D'un brun foncé et sale. Thorax d'un brun jaunâtre sale. Pattes, antennes et mandibules plus pâles.

Hab. COSTA RICA (*Tonduz*).