

Trouvée vivant dans les bulbes d'une orchidée, dans la forêt, du côté de la frontière colombienne. *A. virens*, Forel, est une espèce voisine *.

13. ***Azteca xanthochroa*.** (Tab. IV. figg. 14, 14 a, ♀.)

Liometopum xanthochroum, Roger, Berl. ent. Zeitschr. vii. p. 167 (♀) (1863)¹.

Azteca xanthochroa, Emery, Boll. Mus. Zool. Torino, xi. no. 230, p. 2, figg. 1 (♂ ♀) (1896)².

Hab. MEXIQUE, Teapa en Tabasco (*H. H. Smith*); GUATÉMALA, Las Mercedes 3000' (*Champion*); COSTA RICA (*Alfaro*²).

J'avais d'abord pris la ♀ pour une espèce nouvelle. Mais les ♂ récoltés par M. Alfaro dans un *Cecropia* ont démontré à M. Emery qu'il s'agit de l'*A. xanthochroa*, Roger, confondue jusqu'ici avec les *A. sericea* et *A. instabilis*.

14. ***Azteca aurita*.**

Azteca aurita, Emery, Mem. Accad. Sci. Bologna, (5) iii. p. 146 (♀) (1893)¹.

Hab. COLOMBIE, pied de la Sierra Nevada de Santa Marta (*Forel*).—AMAZONES, Pará (*coll. Oberthür*¹).

Les exemplaires de Colombie correspondent exactement à la description d'Emery.

Race *pilosula*, n. st. (Tab. IV. figg. 15, 15 a, ♀.)

♀. Long. 5.5 millim. Mandibules striées-punctuées. Scapes dépassant légèrement le bord occipital. Les 4 ou 5 premiers articles du funicule épaissis (subclavés) à l'extrémité; les deux premiers longs, presque égaux; le 3^{me} $\frac{1}{3}$ plus court, les suivants plus de deux fois plus longs que larges, sauf les articles 7 à 10, qui sont les plus courts, et deux fois plus longs que larges. Thorax court, bien plus étroit que la tête. Écaille plus courte et plus haute que chez l'espèce typique. Abdomen petit. Tout le corps assez abondamment couvert d'une pilosité dressée, jaunâtre, courte. Sur les pattes et les antennes la pilosité est très courte, très abondante, et un peu oblique. Épistome plus prolongé en arrière, au milieu, que sur la figure de l'espèce typique.

* ***Azteca virens*, sp. n.**

♂. Long. 2.5 à 2.7 millim. Presque pas de dimorphisme de l'ouvrière. Mandibules courtes, à bord terminal droit, armé de 2 à 10 petites dents; elles sont finement réticulées vers la base, lisses, avec quelques points épars sur le milieu et l'extrémité. Très semblable de taille et de forme à l'*A. alfaro*, Emery, ♂ minor, mais la tête plus ovale-rectangulaire, bien plus longue que large, a les côtés plus convexes, est moins élargie en arrière et distinctement rétrécie à l'occiput, qui est plus étroitement échancré au milieu. Les scapes atteignent presque le bord occipital. Les articles 5 à 10 du funicule sont plus épais que longs. Épistome faiblement bisinué. Face basale du métanotum bien plus longue que la face déclive (de même longueur chez l'*A. alfaro*). Écaille peu inclinée en avant, épaisse, obtuse au bord supérieur, mais squamiforme. Du reste, forme et pilosité de l'*A. alfaro*.

Finement réticulée, subopaque, couverte d'un fin duvet assez abondant de pubescence jaunâtre.

D'un jaune brunâtre sale, pâle, en partie translucide et laissant percevoir au travers de tout le corps, des pattes et des antennes une couleur d'un vert herbacé plutôt foncé, provenant du sang plutôt que de la chitine et semblable à celle des chenilles vertes lisses et glabres ou des capsides verts, des locustes vertes etc., moins vive et ternie par la teinte de la chitine.

Hab. AMAZONES, Pará (*Dr. A. Göldi*).

Envoyée avec la tige verte d'une plante où elle paraît faire son nid.