

D'un jaune roussâtre; pattes, funicules, de larges bandes transversales, nébuleuses sur l'abdomen, brunâtres; l'abdomen en somme d'un jaune brunâtre, sauf devant. Ailes brunâtres, avec les nervures et la tache d'un brun plus foncé.

Du reste comme l'espèce typique, avec ses angles occipitaux prolongés en oreilles, les côtés rectilignes de sa tête en trapèze, avec l'occiput largement et profondément échancré, sa chitine lisse etc. Les scapes plus longs, la taille plus grande et la pilosité, sont les caractères les plus distinctifs de cette race.

Hab. COSTA RICA (*Tonduz*); PANAMA, Bugaba (*Champion*).

15. *Azteca trigona*.

Azteca trigona, Emery, Mem. Accad. Sci. Bologna (5), iii. p. 146 (♀) (1893)¹; Boll. Mus. Zool. Torino, xi. p. 3 (♂ ♀) (1896)².

Hab. PANAMA (*Testa*).—AMAZONES, Pará^{1 2}.

J'ai de forts doutes sur l'identité spécifique des ♂ et des ♀ décrites par Emery. Voir plus bas—*A. lacrymosa* et *A. festai*.

16. *Azteca lacrymosa*, sp. n.?

♂. Long. 2.6 à 5 millim.

♂ *major*. Tête longue de 1.5, large de 1.4 millim. Luisante. Extrêmement semblable à ce qu'Emery a décrit sous le nom de *A. trigona* ♂; à peine les côtés de la tête sont-ils d'une idée moins convexes. Aire frontale grande, distincte. L'écaille est un peu plus large, plus obtuse arrondie à son bord supérieur, au milieu duquel elle est faiblement imprimée. Le profil du pronotum est presque plan (distinctement convexe chez l'*A. trigona*, ? ♂). Le mésonotum et le thorax en général sont d'une idée plus allongés, ainsi que les articles du funicule, les pattes etc., l'insecte entier étant légèrement plus grêle. Pubescence moins forte. Tête rougeâtre, ainsi que, plus ou moins selon les individus, le thorax et les pattes. Abdomen brun.

♂ *minima*. Tête longue de 0.8, large de 0.6 millim., élargie derrière, rétrécie devant, à côtés fort peu convexes. Métonotum très plat, à face déclive très courte. Mésonotum convexe, un peu moins allongé que chez la ♂ *major*. Entièrement d'un noir un peu brunâtre luisant, sauf le bord des mandibules et le bord antérieur de l'épistome, qui sont roussâtres. Les scapes, les tarses, parfois aussi l'épistome et les articulations sont plus ou moins brunâtres.

La pubescence est plus faible, ce qui la rend plus luisante que l'*A. trigona* ♂(?). Absolument dépourvue de pilosité dressée.

Hab. COSTA RICA (*Tonduz*).—COLOMBIE, Hacienda de la Esperanza, pied de la Sierra Nevada de Santa Marta (*Lallemand, Forel*).

Trouvée dans un nid sur les arbres dans les forêts du côté de la frontière colombienne par M. Tonduz, et dans un grand nid de carton de 70 centim. de haut et de 40 de large, adossé au tronc d'un arbre, nid dont l'enveloppe extérieure était sculptée en forme de grandes larmes, en Colombie, par moi-même. J'ai trouvé aussi plusieurs nids analogues dans les environs, mais trop élevés sur les arbres pour pouvoir être atteints.

J'ai reçu de M. Tonduz dans le même envoi des ♀ d'*A. aurita*, r. *pilosula*. Serait-ce la ♀? La pilosité toute opposée et la taille m'empêchent encore d'y croire. N'est-ce qu'une race de l'ouvrière que M. Emery attribue à l'*A. trigona*?

[Race *silva*, n.

♂. Long. 3.5 à 4.7 millim.—♂ *major*. Mandibules comme chez l'*A. aurita*. Tête presque aussi large derrière que longue, en trapèze, élargie derrière, où l'occiput est largement et profondément échancré, assez en angle, mais sans que les angles occipitaux se prolongent en oreilles. Côtés de la tête à peine convexes, bien